



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରଦାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ରାଣୀତାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଓଡ଼ିଶା-୭୫୬୧୧୧
(ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ)



ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୧୦/୨୩

ଶୁକ୍ରବାର/ତା.୦୩.୦୨.୨୦୨୩

ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (ତା.୦୮.୦୨.୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ): ଭାରତୀୟ ମୌସୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ , ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ମୁଖ୍ୟତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସାମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦିନ ର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସାମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୫ – ୧୧ କି.ମି. ବେଗ ରେ ବୋହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ପାଣିପାଗଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ଖରାଟିଆ ଧାନ

- ଧାନ ବିହନକୁ ବିଶୋଧନ କରି (୧ କେଜି ବିହନ ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡାଜିମ ବା କାରବୋକ୍ସିନ + ଥିରାମ) ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ତଳି ୩ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟମ କିସମ ଧାନ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକରକୁ ୩୫ କେଜି ଡିଏ ପି ଓ ୧୩ କେଜି ପଟାଶ ସାର ପ୍ରୋକ୍ସାଗ କରନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ

- କରଟିଆ ମାଛି ଓ ପତ୍ର ଛନ୍ଦା ପୋକର(୩ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି) ଦମନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଜାତିୟ ଔଷଧ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପେନୋଫୋସ ୨ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଉ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୫୦୦ ମିଲି ନିମ୍ନଜାତିୟ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ ୬୦ ଗ୍ରାମ/ ଏକର ପ୍ରତି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ମହୁମାଛିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ପରେ ପ୍ରୋକ୍ସାଗ କରନ୍ତୁ ।

ଚିନାବାଦାମ

- ମୂଳସତ୍ତା , କାଣ୍ଡପତା ଓ ଚୀକା ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ (କାରବେଣ୍ଡାଜିମ + ମାକୋଜେବ) ବା (ମେଟାଲୋକ୍ୱିଲ + ମାକୋଜେବ) ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ପତ୍ର ସୁତଜି ପୋକ ଓ ପତ୍ର ଖୁଆ ଗୋଟି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ୨ ମିଲି ଫିପ୍ରୋନୀଲ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଚିନାବାଦାମରେ ଧବଳ ଭୂଙ୍ଗର କ୍ଷେୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬ ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ ବା ୧ ମିଲି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୩୦.୫ଏସ ସି ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଭିଜାନ୍ତୁ ।

ମୁଗ ଓ ବିରି

- ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଧଳାମାଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୋଣକ କୀଟ ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ୧ କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି 5 ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୨୦୦ ଏଫ.ଏସ. ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ବୁଣିବାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜିରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାରବେନଡାଜିମ ଫିମିନାଶକ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ (କାରବୋକ୍ସିନ + ଥିରାମ) ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ବୁଣିବା ଦିନ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିହନରେ , ୨୦ ଗ୍ରାମ ରାଇ ଜୋବିୟମ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ସହିତ ଗୋଳାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଜମିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨ଟନ ଶତା ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ୩୫ କେଜି ଡିଏପି, ୧୩ କେଜି ମ୍ୟୁରେଟ ଅଫ ପଟାସ ଏବଂ ୪ କେଜି ଯୁରିୟା ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବଧାନ ୨୫ ସେ.ମି. x ୧୦ ସେ.ମି. ରଖନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା

- ❖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ।
- ❖ ବାଇଗଣ ଓ ଚମାଟୋ ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ କୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗଛ ମୂଳରେ ନିମ୍ନ କିମ୍ବା କରଞ୍ଜି ପିଡିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. କବକ ନାଶକ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ କୁ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ ଓ ପତ୍ରକୁ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା କୋବି , ବାଇଗଣ, ଚମାଟୋ ଓ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ପତ୍ରଖୁଆ ଓ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଏମାମେକ୍ସିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ କିମ୍ବା ୦.୪ ମି.ଲି. ସିନୋସାଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ଡିପ ଜମିରେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ପରେ ରସୁଣ ଓ ପିଆଜ ଲଗାଇବାର କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।

ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ

- ❖ ଅଷ୍ଟପଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ୨ ମିଲି ପ୍ରୋପାରୋଜାଇଟକୁ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ପରିଲିଖିତ ହେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ (କାରବେଣ୍ଡାଜିମ +ମାଙ୍କୋଜେବ) କୁ ପ୍ରୋୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

N.B.- Use Meghdoot mobile application for location specific weather and agro-advisory.

ଇ ମେଲ- aas_ranital@yahoo.com

