



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୦୮.୧୨.୨୦୨୩ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu  
Jr. Agrometeorologist**

**ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୪୯**

**ତାରିଖ.୦୮.୧୨.୨୦୨୩  
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୯୮**

**ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ  
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୩.୧୨.୨୦୨୩) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

**ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ** – ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସାଧାରଣତ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୪-୦୫ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୭ ଏବଂ ୧୨-୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସକାଳର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା ୬୩-୯୪ ଏବଂ ୨୯-୭୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ( )	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଙ୍କୁ ନ୍ତ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମାଳ	୦୯-୧୨-୨୦୨୩	୨	୨୪	୧୭	୫	୯୪	୭୦	୪	୨୪୦
	୧୦-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୭	୧୪	୪	୮୪	୪୭	୫	୧୭୨
	୧୧-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୭	୧୩	୧	୮୦	୩୯	୫	୧୮୦
	୧୨-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୭	୧୨	୨	୭୫	୩୩	୪	୧୭୦
	୧୩-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୭	୧୨	୩	୭୩	୨୯	୫	୧୮୦

**କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ**

- ଗାଈଭାଇମାନେ ଏବେ ମକା ରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କାମ ପୁଣି ଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
- ପଚିଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ନୂଆ ମଞ୍ଜି ବୁନିବା ଯତ୍ନ କରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗଛ ଉଠିନାହିଁ।
- ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଏହା ଏବେ ଫଳ ଫଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଧୂଆଁପତ୍ର ପୋକୋ ଏଥିରେ ବହୁତ ହାନି କରିଥାଏ।
- ଫେରୋମୋନ ଜନ୍ତା କୁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରକୁ ୫ ଟି ଲେଖାଏ ବସାନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ବାଦ ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସି ପୋକୋ ଖାଇ ପାରିବେ।
- ସୋରିଷ ରେ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ପୋକ ଦମନ ନୀତି ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
- ଶୀତ ଋତୁ ରେ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହ ଲୁଣ, ଚୋକଡ଼ ଓ ଗୁଡ଼ ଆଦି ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।

**ସୋରିଷ-**

- ଏହା ଏବେ ଫଳ ଫଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଧୂଆଁପତ୍ର ପୋକୋ ଏଥିରେ ବହୁତ ହାନି କରିଥାଏ।
- ଫେରୋମୋନ ଜନ୍ତା କୁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରକୁ ୫ ଟି ଲେଖାଏ ବସାନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ବାଦ ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସି ପୋକୋ ଖାଇ ପାରିବେ।
- ସୋରିଷ ରେ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ପୋକ ଦମନ ନୀତି ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।

### **ଚମାଟୋ -**

- ଚମାଟୋ ଏବେ ରୋଇବା କିମ୍ବା ସଅଳ ଲାଗିଥିବା ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି
- ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ବଳକା ପାଣିକୁଆ ଜମିରୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚିଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ନୂଆ ଚାଉଳ ରୁ ପ୍ରତିରୋପଣ କରନ୍ତୁ।

### **ମଜା -**

- ଚାଷିଭାଇମାନେ ଏବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କାମ ପୁଣି ଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
- ପଚିଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ନୂଆ ମଞ୍ଜି ବୁନନ୍ତୁ ଯଉଁଠି ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗଛ ଉଠିନାହିଁ।

### **ମଟର:**

- ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ଗଜଭୂ ଉଠିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି।
- ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ବୁଣିବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ।
- ୩୦ ଦିନ ପରେ ଠେକୁଆ ଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

### **ବରକୋଳି/ପିଢୁଳି -**

- ବରକୋଳି ଓ ପିଢୁଳି ଆଦିର ଫଳକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳ ଗଛକୁ ଠେକୁଆ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏହା ଭଲି ନ ପଡ଼ିବ।

### **ବନ୍ଧାକୋବି/ଫୁଲକୋବି:**

- ଡେରିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କୋବି ରେ ଏବେ **NSKE** ୫% ହିସାବରେ କିମ୍ବା **Cartap Hydrochloride** ୧ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାଦ୍ୱାରା **diamond back moth** ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇହବ।

### **ପଶୁ ପାଳନ:**

- ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦବା ସହ ସଫା ଗୃହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ।
- ଶୀତ ଋତୁ ରେ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହ ଲୁଣ, ଚୋକଡ଼ ଓ ଗୁଡ଼ ଆଦି ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।

**For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).**

**ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER**