



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୧୨.୧୨.୨୦୨୩ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist**

ସମ୍ପାଦକ ସଂଖ୍ୟା- ୫୦

**ତାରିଖ.୧୨.୧୨.୨୦୨୩
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୯୯**

**ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୭.୧୨.୨୦୨୩) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ – ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୪-୦୫ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୪-୨୫ ଏବଂ ୨୩-୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସକାଳର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା ୫୪-୮୨ ଏବଂ ୨୩-୩୨ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି) (ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ))	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ))	ମେଘାଞ୍ଚ କ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମା ଳ	୧୩-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୧୦	୩	୭୩	୩୨	୫	୨୪୦
	୧୪-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୧୦	୩	୭୭	୩୦	୫	୧୭୧
	୧୫-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୧୦	୨	୮୨	୨୯	୪	୧୩୫
	୧୬-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୪	୯	୦	୭୫	୩୧	୫	୧୭୨
	୧୭-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୪	୯	୦	୫୪	୨୩	୫	୧୫୫

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା ପାଳଙ୍ଗ, ଅଳ୍ପ ଗ୍ରୀନ, କୋମଳ ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଆରମ୍ଭ ରେ କମ ଇଉରିୟା ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ।
- ଚାଷିଭାଇମାନେ ରବି ରତ୍ନ ପାଇଁ ଏବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଓ ରୋଇବା କାମ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିପାରିବେ।
- ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ମତରରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଏଫିଡ ପୋକ ମୋତି ଭଳି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସୋରିଷ ର ପତ୍ର, କଢ ଆଦିକୁ ଶୋଷୀ ଖାଇଯାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗେଡା ଅବସ୍ଥା ରେ ରହିଯାନ୍ତି।
- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ **dimethoate@୨୨୫-୧୦୦୦ ମିଲି/ ଏକର** ହିସାବରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।

ଧ୍ୟାନ

- ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ।

- ଧାନ ଥିବା ଜାଗାରେ ମୂଷା ନ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଫାଟ ଜାଗାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନକୁ ଖରାରେ ସୁଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୪% ହେଲ୍ଲା ହେଲ୍ଲା ପରେ ଝୁଟା ଅଖା ରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ।

ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ -

- ପୁଷା ପାଳଙ୍ଗ, ଅଳ ଗ୍ରୀନ, କୋମଳ ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୨୦ କେଜି ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ।
- ଆରମ୍ଭ ରେ କମ ଇଉରିୟା ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ ।
- ଗଛ ବାହାରିଲେ ଘାସ ବାଛି ଠେକୁଆ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ-

- ଏଫିଡ ପୋକ ମୋତି ଭଳି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ସୋରିଷ ର ପତ୍ର, କଢ ଆଦିକୁ ଶୋଷୀ ଖାଇଯାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗେଡା ଅବସ୍ଥା ରେ ରହିଯାନ୍ତି ।
- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ **dimethoate@୨୨୫-୧୦୦୦** ମିଲି/ ଏକର ହିସାବରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।
- ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ଠେକୁଆ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।



ଏଫିଡ ପୋକ



Dimethoate

ମକା -

- ଚାଷିଭାଇମାନେ ଏବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କାମ ପୁଣି ଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ।
- ୧୫ ଦିନର ଗଛ ହେଲେ ବଳକା ଗଛ କୁ ଉପସଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଉରିୟା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ବନ୍ଧାକୋବି/ଫୁଲକୋବି :

- ଡେରିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କୋବି ରେ ଏବେ **NSKE ୫%** ହିସାବରେ କିମ୍ବା **Cartap Hydrochloride** ୧ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାଦ୍ୱାରା **diamond back moth** ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇହବ ।

ମଟର:

- ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ଗଜଭୂ ଉଠିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।
- ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବୁଣିବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ।

- ୩୦ ଦିନ ପରେ ୧୦କୁଆ ଦବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

ମାଛ ଚାଷ :

- ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦବା ସହ ସଫା ଗୃହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ।
- ଶୀତ ଋତୁ ରେ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହ ଲୁଣ, ଚୋକଡ଼ ଓ ଗୁଡ଼ ଆଦି ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER