



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଭଦ୍ରନଗର, ଓଡ଼ିଶା : ୨୨.୧୨.୨୦୨୩ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist**

ସମ୍ବାହ ସଂଖ୍ୟା- ୫୧

**ତାରିଖ ୨୨.୧୨.୨୦୨୩
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୧୦୨**

**ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୨୨.୧୨.୨୦୨୩) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ – ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୪-୦୫ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୪-୨୫ ଏବଂ ୧-୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସକାଳର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା ୭୦-୮୧ ଏବଂ ୨୨-୩୩ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି) (ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସି ୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମା ତ୍ରା(°ସେ ଲସିୟସ)	ମେଘାଢ଼ କ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମା ଳ	୨୩-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୪	୧	୨	୭୦	୨୨	୫	୧୫୮
	୨୪-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୯	୨	୮୧	୩୩	୫	୧୪୮
	୨୫-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୯	୧	୭୩	୨୯	୫	୧୪୮
	୨୬-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୧୦	୩	୭୩	୨୭	୪	୧୫୭
	୨୭-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୧୦	୩	୭୫	୨୭	୫	୧୭୩

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଘୁ. ଭଦ୍ରନଗରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪-୫ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ କକ୍ଷମାଳ ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ କରିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ପତଳା ବରଫ ଆସ୍ତରଣ ହୋଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
- ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତବା ପାଇଁ, ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଗଛ ଆଦିକୁ କପଡ଼ାରେ କିମ୍ବା ପଲିଥିନ ରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି କିମ୍ବା ଧୂଆଁ ଦେଇ ତାପମାତ୍ରାକୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନାହିଁ।
- ହରଡ଼ରେ **ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ**କୁ ଆୟତ କରିବାକୁ, ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ହେକ୍ଟରକୁ ୫୦ ଟି ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଅଜାଡ଼ିରଟିନ ୦.୦୩% **WSP**କୁ ପକାନ୍ତୁ।
- ଟମାଟୋ ରେ ଜିଏ-୩ ହରମୋନ ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଗୁଆ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ।
- କୁସୁମି ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ@୨୦୦ଏମଏଲକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧ ଏକର ରେ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
- ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ ଥିବାରୁ, ପ୍ରାଣୀ ଗୃହାଳରେ ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇ ଖାଲିସ୍ଥାନ ଥିଲ ତାକୁ ରାତ୍ରି ସମୟନର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।

ହରଡ଼ -

- ହରଡ଼ ଏବେ ଫୁଲର ଶେଷ ଏବଂ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।
- ହରଡ଼ରେ ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ଦେଖା ଯାଉଛି ।
- ଏହାକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ, ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ହେକ୍ଟର କୁ ୫୦ ଟି ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଅଜାଡିରଚିନ ୦.୦୩% WSP କୁ ପକାନ୍ତୁ ।



ଚିହ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ



ଅଜାଡିରଚିନ

କନ୍ଦମୂଳ -

- କନ୍ଦମୂଳ ଲଗାଇବାର ୨-୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହାର ଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକାଯାଏ କାରଣ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଟେର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।

ଟମାଟୋ-

- ଜିଏନା କୁ ଫୁଲ ଅଣିବା ସ୍କେଲରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ ।
- ଫଳ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଥରେଲ@ଏମଏଲ/ଲିଟର ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବେ ଫଳ ଆସିଥାଏ ।



ଜିଏ-୩

କୁସୁମି

- କୁସୁମି ରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ@୨୦୦ଏମଏଲ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧ ଏକର ରେ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।



ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ

ବୋକଲି:

- କଢ ଆସିବା ସମୟରେ ବୋରନ ଓ ଏଲୁମିନିୟମ ସ୍ତେ କାଲେ ଅମଳ ବଢିଥାଏ।

ପଶୁ ପାଳନ :

- ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ ଥିବାରୁ, ପ୍ରାଣୀ ଗୃହାଳରେ ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇ ଖାଲିସ୍ଥାନ ଥିଲ ତାକୁ ରାତ୍ରି ସମୟନର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
- ଶୀତ ଋତୁରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲୁଣ, ଚୋକଡ ଓ ଗୁଡ ଆଦି୧୦ ରୁ୨୦ ଶତକଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER