



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୨୭.୧୨.୨୦୨୩ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu  
Jr. Agrometeorologist**

**ସମ୍ବାହ ସଂଖ୍ୟା- ୫୨**

**ତାରିଖ ୨୭.୧୨.୨୦୨୩  
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୧୦୩**

**ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ  
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୩୧.୧୨.୨୦୨୩) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

**ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ** – ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସଫା ରହିବ। ପବନର ବେଗ ୦୪-୦୫ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୫-୨୬ ଏବଂ ୯-୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସକାଳର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା ୭୬-୮୮% ଏବଂ ୨୬-୨୯% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	ମେଘାଢ଼ଳ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମାଳ	୨୭-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୧୦	୦	୮୮	୨୭	୫	୧୫୭
	୨୮-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୫	୯	୦	୭୭	୨୯	୪	୧୫୮
	୨୯-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୬	୧୦	୦	୮୭	୨୮	୫	୧୫୯
	୩୦-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୬	୧୦	୦	୮୦	୨୯	୪	୧୬୧
	୩୧-୧୨-୨୦୨୩	୦	୨୬	୧୦	୧	୭୮	୨୬	୫	୧୬୭

**କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ**

- ହରଡ଼ରେ ଘୂମ ମୋଥ ଦେଖା ଦେଲେ ତାକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଅଜାଡ଼ିରଚଟିନ ୦.୦୩% **WSP** କୁ ୨୫୦୦-୫୦୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ ୩୦**EC** ୧୨୩୭ ଗ୍ରାମ/ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଇମାମେକଟିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ ୫% **SG** ୨୨୦ ଗ୍ରାମ/ହେକ୍ଟର ପକାନ୍ତୁ।
- ଟମାଟୋ ରେ ଜିଏ-୩ ହରମୋନ ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଗୁଆ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ।
- ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ ଥିବାରୁ, ପ୍ରାଣୀ ଗୂହାଳରେ ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇ ଖାଲିସ୍ଥାନ ଥିଲେ ତାକୁ ରାତ୍ରି ସମୟନର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
- ଗଛର ଉପର ଭାଗ କୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଡାଲଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ।
- ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିଲେ ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ରୋଗ (**powdery mildew**) ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଆୟତ କରିବାକୁ **Sulfex**@୩ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।

**ହରଡ଼ -**

- ହରଡ଼ ଏବେ ଫୁଲର ଶେଷ ଏବଂ ଫଳ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି।

- ହରଡ଼ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୋଥ ଦେଖା ଦେଲେ ତାକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ହେକ୍ଟର କୁ ୫୦ ଟି ହିସାବରେ
- ଅଜାଡ଼ିରଚିନ ୦.୦୩% **WSP** କୁ ୨୫୦୦-୫୦୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ ୩୦**EC** ୧୨୩୭ ଗ୍ରାମ/ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଇମାମୋକ୍ରିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ ୫% **SG** ୨୨୦ ଗ୍ରାମ/ହେକ୍ଟର ପକାନ୍ତୁ।



ସ୍ୱଳ୍ପ ମୋଥ

### କନ୍ଦମୂଳ -

- କନ୍ଦମୂଳ ଲଗାଇବାର ୨-୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହାର ଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକାଯାଏ କାରଣ କାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚେର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

### ଫମାଟୋ-

- ଜିଏ୩ କୁ ଫୁଲ ଅଣିବା ସ୍ତରରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ।
- ଫଳ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଥରେଲିଭିଏମଏଲ/ଲିଟର ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବେ ଫଳ ଆସିଥାଏ।



ଜିଏ-୩

### ବୋକଲି:

- କଢ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ବ୍ରୋକଲୀ ରେ ବୋରନ ଓ ଏଲୁମିନିୟମ ସ୍ତ୍ରୋ କଲେ ଅମଳ ବଢ଼ିଥାଏ।

### **ଗୋଟିଏ ପୂଲ:**

- ଗଛର ଉପର ଭାଗ କୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ।
- ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିଲେ ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ରୋଗ (**powdery mildew**) ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଆୟତ କରିବାକୁ **Sulfex@** ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

### **ପଶୁ ପାଳନ :**

- ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମ ଥିବାରୁ, ପ୍ରାଣୀ ଗୃହାଳରେ ପବନ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇ ଖାଲିସ୍ଥାନ ଥିଲ ତାକୁ ରାତ୍ରି ସମୟନର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଶୀତ ଋତୁରେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଲୁଣ, ଚୋକଡ ଓ ଗୁଡ ଆଦି ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

**For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).**

**ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER**