



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର  
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା  
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -49

ତାରିଖ-05.12.2023

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ହାଲୁକା ରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 4-7 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 26-28 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15-19 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	06-12-2023	5	27	19	6	96	86	5	72
	07-12-2023	7	26	19	6	96	88	7	68
	08-12-2023	2	27	17	5	95	84	6	68
	09-12-2023	1	28	16	3	94	77	5	112
	10-12-2023	0	28	15	1	86	60	4	112

**ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :**

ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି । କୋବି, ପେଣୀ, ଘୂଗ, ବିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଲଗେଇଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଗ ପୋକ ର ସଠିକ ନିରକ୍ଷଣ

କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାତ୍ୟା କାରଣ ରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଔଷଧ ଏବେ କ୍ଷେତ ରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ।

### ଧାନ :

- କୃଷକମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- ଖଳା ଚଟାଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ।
- ଧାନ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ରେ Aluminium phosphide @ 3 ଟାଙ୍କେଟ୍ସ ପ୍ରତି ଚନ୍ ରଖନ୍ତୁ।

### ସୋରିଷ:

- ସୋରିଷରେ ଧଳା ରକ୍ଷ (White rust) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Metalaxyl + Mancozeb ( Ridomil MZ) @ 0.2% ମାତ୍ରା ରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଡା ଖୋସା , ତୃଣକ ଏବଂ ପତଳା (ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ) କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

### ପତ୍ତିପତ୍ତିବା :

- **ଫୁଲକୋବି:**
- 30-35 ଦିନ ପରେ ବଳକା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗଛ ରୁ କିଛି ଦୂରତାରେ ପକାନ୍ତୁ।
- ଫୁଲକୋବିରେ କଟା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲର ଅଞ୍ଚଳରେ Chlorpyrifos 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଫୁଲକୋବିରେ ପତ୍ତିପତ୍ତିବା କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Carbendazim @ 1 g/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- **ବନ୍ଧାକୋବି:**
- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chlorpyrifos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ବାଇଗଣ:**

- ଫୋମୋପସିସ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଇଗଣରେ ପ୍ରତି ଏକରକୁ ପ୍ରୋପିନେବ @ 400mg ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଇଗଣରେ କାନ୍ଧ ଏବଂ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

### ଫଳ:

- **କଦଳୀ :**
- କଦଳୀରେ ସିଗାତୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେଲେ, ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Carbendazim କିମ୍ବା Propiconazole @ 0.1 % ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କଦଳୀରେ ଜଉପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 2ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କାରଣତୁ ।

### ଅମୃତଭଣ୍ଡା:

- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ NSKE 5% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ରୁ ଦୁଇଥର ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।

### ଫୁଲ:

#### ଗୋଲାପ:

- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lt କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

**TECHNICAL OFFICER**

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖଟ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) ।

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

**Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>),  
(iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)**