



**ଗ୍ରାମୀଣକୃଷିମୌସମସେବା, କେନ୍ଦୁଝର**  
**ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା**  
**ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ**  
**ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର**

**ସପ୍ତାହ -49 ତାରିଖ-08.12.2023**

**ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ –କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ**

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି**। ପବନ ର ବେଗ 5-6 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 20-26 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13-15 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
<b>KENDUJHARGARH</b>	09-12-2023	3	20	15	6	93	72	5	195
	10-12-2023	0	24	14	4	78	54	5	165
	11-12-2023	0	26	13	3	65	45	6	162
	12-12-2023	0	26	13	2	51	36	6	199
	13-12-2023	0	26	13	3	54	32	5	180

**ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :**

ଧାନ କିଆରି ରେ ଅଧିକା ଜଳ ଥିଲେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି । କୋବି, ପେଣୀ, ମୁଗ, ବିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଧାନ

ଅମଳ ପରେ ଲଗେଇଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗ ପୋକ ର ସଠିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଔଷଧ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ଛାଡ଼ିକି ପକାନ୍ତୁ।

### ଧାନ :

- କୃଷକମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- ଖଳା ଚଟାଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ।
- ଧାନ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ରେ Aluminiumphosphide@ 3 ଟାଙ୍କେଟ୍ସ ପ୍ରତି ଚନ୍ ରଖନ୍ତୁ।

### ତୋରିଆ:

- ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ର ଗଛ ହୋଇଗଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ 10 cm ର ଦୂରତା ବ୍ୟାପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ MethylDemeton@ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଡା ଖୋସା , ତୃଣକ ଏବଂ ପତଳା (ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ) କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।

### ପତ୍ତିପରିବା :

- **ପୋଚଳ:**
  - ❖ ପୋଚଳ ରେ downymildew କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ Metalaxyl + Mancozeb@ 400 g ପ୍ରତି ଏକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- **ବନ୍ଧାକୋବି:**
  - କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos@ 2 ml/l ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
  - ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/l ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ବାଇଗଣ:**

- ଫୋମୋପସିସ୍, ଲାଲଗ୍ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଇଗଣରେ ପ୍ରତି ଏକରକୁ ପ୍ରୋପିନେବ @ 400mg ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ବାଇଗଣରେ କାନ୍ଧ ଏବଂ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- **ଚମାଟୋ:**
- ଧଳା ମାଛି ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, Thiomethoxam 25 % WG @ 40 g ପ୍ରତି ଏକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

#### ଫଳ:

- **ଆମ୍ବ:**
- ଆମ୍ବରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, Carbendazim (0.1%) କିମ୍ବା Tridemorph (0.1%) କିମ୍ବା Karathane (0.1%) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- **କଦଳୀ :**
- କଦଳୀରେ ସିଗାଟୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେଲେ, ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Carbendazim କିମ୍ବା Propiconazole @ 0.1 % ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କଦଳୀରେ ଜଉପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 2ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- **ଅମୃତଭଣ୍ଡା:**
- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ NSKE 5% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ରୁ ଦୁଇଥର ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

#### ଫୁଲ:

- **ଗୋଲାପ:**
- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lt କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

**TECHNICAL OFFICER**

---

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

**Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>),  
(iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)**