



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -50

ତାରିଖ-12.12.2023

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ - କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପବନ ର ବେଗ 4-6 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 25-26 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 09-10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	13-12-2023	0	25	9	2	70	38	4	158
	14-12-2023	0	25	10	1	73	38	5	112
	15-12-2023	0	26	10	2	55	35	5	160
	16-12-2023	0	25	10	0	47	29	6	158
	17-12-2023	0	25	10	0	45	27	6	146

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ମାଟି ସଠିକ୍ ଶୁଖିବା ପରେ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
ଉପଲବ୍ଧ ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ପାୟରା କ୍ରପ୍ - କୋବି, ପେଶୀ, ମୁଗ, ବିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଧାନ ଅମଳ ପରେ

ଲଗେଇଦିଅନ୍ତୁ| ବିଗତ ଦିନରେ ସିଂଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ | ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି |

ଧାନ :

- ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ |
- କୃଷକମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଅମଳ କରି ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- ଖଳା ଚଟାଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ।
- ଧାନ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ରେ Aluminium phosphide @ 3 ଟାଙ୍କେଟ୍ସ ପ୍ରତି ଟନ ରଖନ୍ତୁ।

ସୋରିଷ ଏବଂ ଚୋରିଆ:

- ରୋଗ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯତ୍ନ ସହ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।
- ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆର୍ଦ୍ର ରଖନ୍ତୁ |
- ସୋରିଷରେ ଧଳା ରକ୍ଷ (White rust) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil MZ) @ 0.2% ମାତ୍ରା ରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଡା ଖୋସା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |

ପନିପରିବା :

- **ବାଇଗଣ:**
- ବାଇଗଣରେ କାନ୍ଧ ଏବଂ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- **କୋଶଳା ଶାର:**

- କୋଶଳା ଶାଗ ରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Carbendazim @ 1 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ଫୁଲକୋବି:**

- 30-35 ଦିନ ପରେ ବଳକା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗଛ ରୁ କିଛି ଦୂରତାରେ ପକାନ୍ତୁ।
- ଫୁଲକୋବିରେ କଟା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଲର ଅଞ୍ଚଳରେ Chlorpyriphos 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
- ଫୁଲକୋବିରେ ପତ୍ରଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Carbendazim @ 1 g/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ବନ୍ଧାକୋବି:**

- କାଣ୍ଡବନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ପୋଚଳ:**

- ପୋଚଳ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫାର ପାଉଡର 0.2% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫଳ:

- **କଦଳୀ :**

- କଦଳୀରେ ସିଗାଡୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେଲେ, ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Carbendazim କିମ୍ବା Propiconazole @ 0.1 % ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କଦଳୀରେ ଜଉପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 2ml/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କାରଣତୁ।

- **ଅମୃତଭଣ୍ଡା:**

- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ NSKE 5% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ରୁ ଦୁଇଥର ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:

- **ଚୋଣ୍ଡ:**

- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଗୋଲାପ:
- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lit କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT** କାଲିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍ପାଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଗ୍‌ଡୁଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>),
(iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)