ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -51 ତାରିଖ-19.12.2023

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପବନ ର ବେଗ 4-6 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 24-25 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9-11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	20-12-2023	0	24	9	0	51	30	6	126
	21-12-2023	0	24	9	2	48	27	6	158
	22-12-2023	0	24	9	3	44	26	4	112
	23-12-2023	0	25	10	3	54	27	4	150
	24-12-2023	0	25	11	2	57	30	5	150

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ | ଶୀତଲହରୀ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ସିଂଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ | ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି |

ସୋରିଷ:

- 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଡା ଖୋସା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |
- ମାଟି ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।
- ସୋରିଷରେ ଧଳା ରଷ୍ଟ (White rust) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil MZ) @ 0.2% ମାତ୍ରା ରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ମୁଗ:

- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Acetamiprid 20% SP @ 20gm/acre ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ସାହେବୀ ରୋଗ (Mungbean yellow mosaic virus) ଦେଖା ଗଲେ, ଗଛକୁ ଓପାଡି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଧଳା ମାଛି ର ଭୂମିକା ଅଧିକା।
- ଧଳା ମାଛି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସିଟାମିପ୍ରିଡ (Acetamiprid) 20 SP @ 250 gm/ha ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପନିପରିବା :

- **ଟମାଟୋ :**
- ଟମାଟୋ ରେ blight ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ, Zineb 75% WP @ 800 gm ପ୍ରତି ଏକର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
- ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖା ଦେଲେ, Quinalphos 25% EC @ 1 ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ଭେଣ୍ଡି:**
- ଭେଣ୍ଡିରେ ହଳଦିଆ ଶିରା ମୋଜାଇକ୍ ଭାଇରସ୍ (Yellow vein mosaic virus), ଧଳା ମାଛି ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର କରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମିଥାଇଲ୍ ଡେମେଟନ୍ (Methyl demeton) 25 EC @ 1.6 ml କିମ୍ବା ଥିଓମେଟୋକ୍ସାମ (Thiomethoxam) 25 WG @ 2 gm/lt ପାଣିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
- ଭେଣ୍ଡି ରେ ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଛ ର ଭାଗ କୁ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି ଲି .Malathion ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- **କୋଶଳା ଶାଗ:**
- କୋଶଳା ଶାଗ ରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Carbendazim @ 1 g/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ବନ୍ଧାକୋବି:**
- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ୱା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ପୋଟଳ:**
- ପୋଟଳ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫାର ପାଉଡର 0.2% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫଳ:

- **କଦଳୀ :**
- କଦଳୀରେ ସିଗାଟୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେଲେ, ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Carbendazim କିମ୍ୱା Propiconazole @ 0.1 % ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କଦଳୀରେ ଜଉପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 2ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କାରଣନ୍ତୁ।

- **ଅମୃତଭଣ୍ଡା:**
- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ NSKE 5% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ରୁ ଦୁଇଥର ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:

- **ଗେଣ୍ଡୁ:**
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ୱା Dimethoate @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ଗୋଲାପ:**
- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lt କିମ୍ୱା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ପଶୁ ପାଳନ:

- **ଗାଈ ପାଳନ :**
- ଗୁହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- ତରଳ ପାନୀୟ ପିବା କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଶିତଲହରୀ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁହାଳଘର କୁ ଗରମ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

- **କୁକୁଡା ପାଳନ:**

- କୁକୁଡା ଚିଆଁ କୁ ଟୀକାକରଣ ନ କରେଇଥିଲେ, କରେଇଦିଅନ୍ତୁ।

- ଶୀତଳହରି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁକୁଡା ଘରକୁ ଚାରି ପଟରୁ ଘୋରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, OUAT କାଳିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot), (iOS: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155)