



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -51

ତାରିଖ-22.12.2023

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପବନ ର ବେଗ 4-5 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 24-26 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9-11 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	23-12-2023	0	24	9	2	65	34	4	116
	24-12-2023	0	25	10	3	65	39	4	144
	25-12-2023	0	25	11	0	66	34	4	135
	26-12-2023	0	26	11	0	67	35	5	117
	27-12-2023	0	26	11	0	61	34	5	105

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଶୀତଲହରୀ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ବିଗତ ଦିନରେ ସିଂଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ । ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ।

ସୋରିଷ:

- 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଡା ଖୋସା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
- ମାଟି ଶୁଖିଯାଇଥିଲେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ସୋରିଷରେ ଧଳା ରଷ୍ଟ (White rust) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil MZ) @ 0.2% ମାତ୍ରା ରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୁଗ:

- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Acetamiprid 20% SP @ 20gm/acre ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସାହେବୀ ରୋଗ (Mungbean yellow mosaic virus) ଦେଖା ଗଲେ, ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଧଳା ମାଛି ର ଭୂମିକା ଅଧିକ ।
- ଧଳା ମାଛି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସିଡାମିପ୍ରିଡ (Acetamiprid) 20 SP @ 250 gm/ha ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା :

- **ଭେଣ୍ଟି:**
- ଭେଣ୍ଟିରେ ହଳଦିଆ ଶିରା ମୋଜାଇକ୍ ଭାଇରସ୍ (Yellow vein mosaic virus), ଧଳା ମାଛି ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର କରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମିଥାଇଲ୍ ଡେମେଟନ୍ (Methyl demeton) 25

EC @ 1.6 ml କିମ୍ବା ଥିଓମେଟୋକ୍ସାମ (Thiomethoxam) 25 WG @ 2 gm/lit ପାଣିରେ ସ୍ତୁ କରନ୍ତୁ।

- ଭେଣ୍ଟି ରେ ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଲେ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗଛ ର ଭାଗ କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି .ଲି Malathion ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

• **କୋଶଳା ଶାଗ:**

- କୋଶଳା ଶାଗ ରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Carbendazim @ 1 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

• **ବନ୍ଧାକୋବି:**

- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

• **ପୋଟଳ:**

- ପୋଟଳ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫାର ପାଉଡର 0.2% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫଳ:

• **କଦଳୀ :**

- କଦଳୀରେ ସିଗାତୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେଲେ, ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Carbendazim କିମ୍ବା Propiconazole @ 0.1 % ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କଦଳୀରେ ଜଉପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 2ml/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କାରଣତୁ।

• **ଅମୃତଭଣ୍ଡା:**

- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ NSKE 5% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ରୁ ଦୁଇଥର ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:

• **ଗେଣତୁ:**

- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

• **ଗୋଲାପ:**

- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lit କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ପଶୁ ପାଳନ:

- **ଗାଈ ପାଳନ :**
 - ଗୂହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
 - ତରଳ ପାନୀୟ ପିବା କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
 - ଶିତଲହରି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୂହାଳଘର କୁ ଗରମ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- **କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ:**
 - କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୁ ଟୀକାକରଣ ନ କରେଇଥିଲେ, କରେଇଦିଅନ୍ତୁ।
 - ଶିତଲହରି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଚାରି ପଟରୁ ଘୋରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଳିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଚିପୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେନ୍ଦୁତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)