



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର  
 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା  
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ  
 ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -52

ତାରିଖ-29.12.2023

**ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ**

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପବନ ର ବେଗ 4-5 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 26-27 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 13-14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
<b>KENDUJHARGARH</b>	30-12-2023	0	26	13	0	68	36	4	135
	31-12-2023	0	27	13	0	70	34	4	155
	01-01-2024	0	27	13	0	70	33	4	198
	02-01-2024	0	27	14	0	72	32	5	200
	03-01-2024	0	27	14	1	74	35	5	153

**ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :**

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।

- ଧାନ କାଟିଲା ପରେ ଖରାରେ ସୁଖେଇଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ନଡ଼ାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ନଡ଼ାକୁ ଜିଆଖତ ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ବିଗତ ଦିନରେ ସିଂଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ।

### ମୃଗ:

- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Acetamiprid 20% SP @ 20gm/acre ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସାହେବୀ ରୋଗ (Mungbean yellow mosaic virus) ଦେଖା ଗଲେ, ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଧଳା ମାଛି ର ଭୂମିକା ଅଧିକ ।
- ଧଳା ମାଛି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସିଡାମିପ୍ରିଡ (Acetamiprid) 20 SP @ 250 gm/ha ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

### ସୋରିଷ ଏବଂ ଡୋରିଆ:

- ସୋରିଷରେ ଧଳା ରଷ୍ଟ (White rust) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Metalaxyl + Mancozeb ( Ridomil MZ) @ 0.2% ମାତ୍ରା ରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

### ଧାନ :

- ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ।
- ଖଳା ଚଟାଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ରେ Aluminium phosphide @ 3 ଟାଙ୍କେଟ୍ସ ପ୍ରତି ଚନ୍ ରଖନ୍ତୁ ।

### ପତ୍ତିପରିବା :

- **ବନ୍ଧାକୋବି:**
- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

**ଫୁଲକୋବି:**

- ଜଉପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 25 ଟି ଆଲୋକ ଜଞ୍ଜା ବସାନ୍ତୁ।
- ହାତରେ ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
- ଦେହଲୀ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି Thiomethoxam 25% WG @ 80g କିମ୍ବା Acetamiprid 20% SP @ 30g, 200 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

**କୋଶଳା ଶାଗ:**

- କୋଶଳା ଶାଗ ରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Carbendazim @ 1 g/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

**ପୋଟଳ:**

- ପୋଟଳ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫାର ପାଉଡର 0.2% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

**ଲଙ୍କା:**

- ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

**ଫଳ:**

**କଦଳୀ :**

- କଦଳୀରେ ସିଗାଡୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେଲେ, ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ Carbendazim କିମ୍ବା Propiconazole @ 0.1 % ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କଦଳୀରେ ଜଉପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 2ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କାରଣତୁ।

**ଅମୃତଭଣ୍ଡା:**

- ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ଧଳା ମାଛି ର ଦମନ ପାଇଁ NSKE 5% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ରୁ ଦୁଇଥର ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

**ଫୁଲ:**

**ଗୋଶୁ:**

- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।

- 30 ଦିନ ପରେ ଗଛର ଅଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଶାଖା ଅଧିକା ଆସିବ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- **ଗୋଲାପ:**
- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lit କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

### ପଶୁ ପାଳନ:

- **କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ:**
- କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୁ ଟୀକାକରଣ ନ କରେଇଥିଲେ, କରେଇଦିଅନ୍ତୁ।
- ଶୀତଳହରି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଚାରି ପଟରୁ ଘୋରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

**TECHNICAL OFFICER**

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

**Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)**