



# ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 08-12-2023

ରାୟଗଡ଼(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-08 ( ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ )

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-09	2023-12-10	2023-12-11	2023-12-12	2023-12-13
ବର୍ଷା (ମିମି)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	30.0	30.0	31.0	31.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	19.0	18.0	17.0	15.0	15.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	94	88	87	85	85
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	52	48	40	35	31
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4	4	4	4	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	135	158	150	158	161
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ)	4	4	3	3	4

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

<p>ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା   ଆସକ୍ତାକାଳି ବହୁତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି   ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30.0 ° C-31.0 ° C ରହିବ   ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.0 ° C-19.0 ° C ରହିବ   ପବନର ବେଗ 4.0-5.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ   ପୂର୍ବାହ୍ନ (85-94%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (31-52%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରେ  </p>
<p>ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା   ଆସକ୍ତାକାଳି ବହୁତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି   ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30.0 ° C-31.0 ° C ରହିବ   ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.0 ° C-19.0 ° C ରହିବ   ପବନର ବେଗ 4.0-5.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ   ପୂର୍ବାହ୍ନ (85-94%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (31-52%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରେ  </p>

### ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

<p>ବର୍ଷା ପରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ରେ ମୂଳ ସଜା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ରୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ସ୍ତେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ଓ ୨୦ ଗ୍ରାମ ମେଟାଲାଇଟ୍ରିଲ ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ମିଶ୍ରଣ କୁ ଫସଲ ର ମୂଳ ଓ ମାଟି କୁ ଭିଜାନ୍ତୁ  </p>
<p>ବର୍ଷା ପରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ରେ ମୂଳ ସଜା ଓ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ରୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ସ୍ତେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ ଓ ୨୦ ଗ୍ରାମ ମେଟାଲାଇଟ୍ରିଲ ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ମିଶ୍ରଣ କୁ ଫସଲ ର ମୂଳ ଓ ମାଟି କୁ ଭିଜାନ୍ତୁ  </p>

**ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:**

ସାଂପ୍ରତିକୃତ ଜଳବାୟୁ ରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ରେ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ରୋଗ ଲାଗିପରେ, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ କୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବ ରେ ଗୋଳାଇ ସିଂଚନ କ
ସାଂପ୍ରତିକୃତ ଜଳବାୟୁ ରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ରେ ଫିମ୍ପି ଜନିତ ରୋଗ ଲାଗିପରେ, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ କୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବ ରେ ଗୋଳାଇ ସିଂଚନ କ

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ରୁଆ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି ପୂରଣ ରୁ ଅମଳ (୧୩ – ୧୭ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି। ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି। ମଞ୍ଜି ପାକଳ ହେବା ଅବସ୍ଥା ରେ ଜମି ରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ। ୮୦-୮୫% ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ପାକଳ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା	ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କପା ଗଛ ହଟାତ ଝାଉଁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କୋବାଲ୍‌କ୍ଲୋରାଇଡ ୧୦ମି. ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ ୨୫ ଗ୍ରା. + ୨୦୦ ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ କିମ୍ବା କାରବେନଡାଜିମ୍ ୧୦ ଗ୍ରା. କୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ କୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଣି ଜମିରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଧାନ	ରୁଆ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି ପୂରଣ ରୁ ଅମଳ (୧୩ – ୧୭ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି। ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମଳ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି। ମଞ୍ଜି ପାକଳ ହେବା ଅବସ୍ଥା ରେ ଜମି ରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ। ୮୦-୮୫% ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜି ପାକଳ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା	ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କପା ଗଛ ହଟାତ ଝାଉଁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କୋବାଲ୍‌କ୍ଲୋରାଇଡ ୧୦ମି. ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ ୨୫ ଗ୍ରା. + ୨୦୦ ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ କିମ୍ବା କାରବେନଡାଜିମ୍ ୧୦ ଗ୍ରା. କୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ କୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପାଣି ଜମିରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମିଷ୍ଟାନ୍ନ	ଫଳସଫୁଲ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୮.୩% + ମାଙ୍କୋଜେବ ୨୬.୭% ଡବ୍ଲୁଜି ୩ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି ୦.୫ ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫଳସଫୁଲ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୮.୩% + ମାଙ୍କୋଜେବ ୨୬.୭% ଡବ୍ଲୁଜି ୩ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି ୦.୫ ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ମିଷ୍ଟାନ୍ନ	ଫଳସଫୁଲ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୮.୩% + ମାଙ୍କୋଜେବ ୨୬.୭% ଡବ୍ଲୁଜି ୩ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି ୦.୫ ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫଳସଫୁଲ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୮.୩% + ମାଙ୍କୋଜେବ ୨୬.୭% ଡବ୍ଲୁଜି ୩ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରେବିନିଲ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି ୦.୫ ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
	କରକ୍ରମ