



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 12-12-2023

ରାୟଗଡ଼(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-12 (ଆସକା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-13	2023-12-14	2023-12-15	2023-12-16	2023-12-17
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	31.0	31.0	30.0	30.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	18.0	17.0	18.0	18.0	17.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	91	86	82	71	60
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	38	33	31	32	26
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4	4	4	4	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	158	158	158	155	158
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	2	3	3	0	0

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଏବଂ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30.0 ° C-31.0 ° C ରହିବ । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17.0 ° C-18.0 ° C ରହିବ । ପବନର ବେଗ 4.0-5.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ । ପୂର୍ବାହ୍ନ (60-91%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (26-38%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ତଳିଘରା କୁ ଅଣ୍ଡା ଦାଉ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ତଳିଘରା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ଗୁଣ୍ଡର ଏକ ପତଳାଆସ୍ତରଣ ପକାନ୍ତୁ । ତଳିଘରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୋରଖେଲ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିଆ ପାଣି କାଟିଦେବି ମାଟିକୁ ଓଦାକରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଘରା କୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପଲିଥିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡେଇ ରଖନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ସଞ୍ଚଳ ଲଗାଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ରେ ବର୍ଷା ପରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମାଟି ରେ ଲାଗିଯାଇ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ତାଉଳ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସଫାଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟେଟ୍ @ ୩ ଟନ / ହେକ୍ଟାୟାର୍ / ଟନ୍ ଧାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାୟୁ ଟାଉଣ୍ଡ ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଫାଙ୍କ ନ ଦେଇ ମୋଟା ଚାଉଳିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଲ ପ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
	ଟ୍ୟାବଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାକରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂତା ଅଳିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ପ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ତୁଳା	ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କପା ଗଛ ହଟାତ ଝାଉଁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ କୋବାଲ୍‌କୋରାଇଡ ୧୦ମି. ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ ୨୫ ଗ୍ରା. + ୨୦୦ ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ କିମ୍ବା କାରବେନଡାଜିମ୍ ୧୦ ଗ୍ରା. କୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ କୁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ । <input type="checkbox"/> ପାଣି ଜମିରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜମିରୁ ବଳକା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । <input type="checkbox"/> ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ମସୁର/ହରଡ଼	ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ଛନ୍ଦା ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପତ୍ର ଛନ୍ଦା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ ୫୦% ଇ.ସି + ସାଇପରମେଥ୍ରାନ୍ ୫ % ଇ.ସି କିମ୍ବା ପ୍ରୋପେନୋଫୋସ ୫୦% ଇ.ସି ୨ ମି.ଲି ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । <input type="checkbox"/> ହାତ ଦ୍ଵାରା ଘାସ ବଛା କାମ ଶୀଘ୍ର ସର ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ରେନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଇମାଥୋଥାପାଇର ୧୦ % ଏସ .ଏଲ୍ ୧.୫ ମି.ଲି ଓ ଏମ୍ .ଏସ୍ .ଓ ଆଡକ୍ସୁଭେକ୍ସ ୨.୦ମି.ଲି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । <input type="checkbox"/> ଶୋଷକ କୀଟ ଯଥା ଜଉ ଓ ଉକୁଶିଆ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଥାଧାରିତକୀଟନାଶକ ୩ ମିଲି କୁ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମକା	ଜଉ ଓ ଉକୁଶିଆ ପୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୨ ଗ୍ରା. ଥିଓମେଥୋକ୍ସମ୍ ୨୫ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି କିମ୍ବା କି ୦.୩ ମି.ଲି.ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । <input type="checkbox"/> କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବି ପୋକ କୁ ଦମନ କରିବା ରି ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସା ହି ବରେ ଫିପ୍ରୋନିଲିନି ୫% SC କିମ୍ବା କି ପ୍ରୋପେନୋଫୋସ ୫୦% ଇ.ସି କୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । <input type="checkbox"/> ଫଲ ଆର୍ମ୍ ଝର୍ମ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ ୦.୪ ଗ୍ରା. ଇମାମେକ୍ଟିନବେନଜୋଏଟ୍ସୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବନ୍ଧାକୋବି	ଆଗୁଆ ଲଗାଯାଇଥିବା କୋବି ଫସଲ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରେ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକର ଶୁକ ଗୁଡ଼କି ପତ୍ର ତଳ ପଟେ ପତ୍ର ଭିତ ର କୁ ପଶି ସବୁଜ ଅଂଶ କୋବି ଖାଆନ୍ତାଏ। ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ଦିଶିପାରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ରେ ଏମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଭିତର କୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହା ର କଅଁଳିଆ ମଝି ପତ୍ର କୁ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ କୋବି ଖାଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। କୋବି ଫସଲ ରେ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬-୮ ଟି ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ରେ ଏହି ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧-ଲିଟର ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦-ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ଉପାୟ ରେ ଏହି କୀଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦-ମିଲି Tolfenpyrad ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୨୦-ଗ୍ରାମ Flubendiamide ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୮୦-ଗ୍ରାମ Emamectin Benzoate 5 % SG କୁ, 200- ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଆଳୁ	ବର୍ଷା ସହିତ ଶୁଷ୍କ ଋତୁ ପାଣିପାଗ ର ପ୍ରଭାବ ରେ ଆଳୁ ରେ ସଅଳ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଳୁ ର ସଅଳ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ ୩ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ ୫୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପି କିମ୍ବା ୬ ଗ୍ରାମ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୨% ଏସସି କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ କାପଟାନ ୭୦% ଓ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୫% ଡବ୍ଲ୍ୟୁପି ର ମିଶ୍ରିତ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୧୨% ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ୬୩% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପି ର ମିଶ୍ରିତ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ୨୫% ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ୫୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁପି ର ମିଶ୍ରିତ ମିଶ୍ରଣ କୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଇ	ଶୀତ ଋତୁରେ ଗାଇଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦିନ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ସହ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡ଼ା ଲୁଣ, ଚୋକଡ ଓ ଗୁଡ ମିଶାଇଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।