



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା**  
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



# କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 19-12-2023

ଭାରତୀୟ (ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-19 ( ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-20	2023-12-21	2023-12-22	2023-12-23	2023-12-24
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	56	53	72	87	83
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	26	23	21	26	29
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	4	4	4	4
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	158	158	160	158	154
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	2	1	3	3	4

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା |  
 ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 28.0 ° C-29.0 ° C ରହିବ | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14.0 ° C-15.0 ° C ରହିବ | ପବନର ବେଗ 4.0-5.0  
 କିଲୋମିଟର ରହିବ | ପୂର୍ବାହ୍ନ (53-87%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (21-29%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ |

### ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଋଷି ଫସଲ ରେ ଶୋଷକ କୀଟ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି |  
 ଏହାର ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ | ଋଷି ପନିପରିବା ରେ ଘାସ ବାଛି କୋଡାଖୋସା କରନ୍ତୁ | କୋବି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ରି ଫସଲରେ  
 ୭-୮ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ | ଶୀତ ଋତୁ ରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଅଣା ଦ୍ୱାରା  
 ଆଚ୍ଛାଦିକରଣ କରିବା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ | କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିବା ଘରେ ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଝିଟର କିମ୍ବା ୨୦୦ ଖାତ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ |

### ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

କୁହୁଡ଼ି ଓ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରୁ ପନିପରିବା କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ରେ ହାଲୁକା ଜଳ  
 ସେଚନ କରନ୍ତୁ |

### ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଡାଲୁଆ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳ କ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ଯଥା ସତ୍ୟଭାମା, ସହଭାଗୀ ଧାନ, ମହାକିନୀ, ମନସ୍ୱିନୀ, ତିଆରଆର -୪୨, ତିଆରଆର -୪୩, ତିଆରଆର -୪୪, ବୀଣା-୧୧, ଜିବି-ବି୧, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ଏମଟିୟୁ-୧୦୧୦, ଏମଟିୟୁ-୧୦୦୧, ନବୀନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟା ଇତ୍ୟାଦି ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୨୦ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ନାମକ ଫିଫିନାଶକ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିନ ଏବଂ ଥିରାମ ର ମିଳିତ ଫିଫିନାଶକ କୁ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା	ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖି ସକାଳ ୯ଟା ପରେ କାକର ଶୁଖିଗଲା ପରେ କପା ତୋଳନ୍ତୁ । କପା ତୋଳିବା ପାଇଁ ସଫା କନା ମୁଣା ବା ବାସ୍ନେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କପା ତୋଳିବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, କାଠି ଆଦି ବାହାର କରିଦେରି ଉଚିତ । ଅମଳ ହୋଇଥିବା କପାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ବା ଚାରପୋଲିନ ପାଲ ଉପରେ ଚାଣ ଖରାରେ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ତୋଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୋଳା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ତୋଳା କପା କୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ରୁ ଅଧିକ କିସମର କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ କିସମ ଅନୁସାରେ ତୁଳା କୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । କପା ରେ ଧୂଳି, ମାଟି, ପଲିଥିନ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶିବା କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସୂଫୋବେର	ଶୀଘ୍ର ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଖୀ ରେ ହୁଡା ଟେକନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ କିସମ ପାଇଁ ୩ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ହାଇକ୍ରିଡ ଗୁଡିକ ରେ ୬ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାର ଯୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ହୁଡା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ନ ଗଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ଓପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ସୋରିଷ	ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ଚାଷ ରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପତ୍ରପାତା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା କୁ ନୟନୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୨୦୦ ମିଲି ଆଜୋକ୍ସିଷ୍ଟୋବିନ୍ ୨୩% ଏସ.ସି. ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଫୁଲକୋବି	ଫୁଲକୋବି, ରେ ପତ୍ର ଖାଇବା ଶିଂବାଲୁଆ ଏବଂ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ ୦.୫ ଗ୍ରାମ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେନୋଜୋର୍ କିମ୍ବା ୦.୪ ମିଲି ସିନୋସାଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଛେଳି	PPR ରୋଗ ଶୀତଦିନେ ‘ଛେଳି ମହାମାରୀ’ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ ଯାହା ଛେଳି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯାହା ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର, ନିମୋନିଆ ଏବଂ କାଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ପ୍ରଭାବିତ ପଶୁମାନେ ଅସ୍ଥିର ଦେଖାଯାନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରାଣୀ ଗର୍ଭପାତ କରିପାରନ୍ତି । ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚୀକାକରଣ କରିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।