



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 26-12-2023

ରାଜ୍ୟଗତ(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-12-26 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-12-27	2023-12-28	2023-12-29	2023-12-30	2023-12-31
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	29.0	29.0	30.0	30.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	16.0	16.0	15.0	16.0	16.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	91	85	91	85	87
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	27	32	29	29	26
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	4	4	5	4	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	161	161	154	161	158
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ)	0	0	0	0	3

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆଗାମୀ ତାରି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 29.0 ° C-30.0 ° C ରହିବ । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.0 ° C-16.0 ° C ରହିବ । ପବନର ବେଗ 4.0-5.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ । ପୂର୍ବାଞ୍ଚ (85-91%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (26-32%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ରବି ଫସଲ ରେ ଶୋଷକ କୀଟ, ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ରବି ପନିପରିବା ରେ ଘାସ ବାଛି କୋଡାଖୋସା କରନ୍ତୁ । କୋବି ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ରି ଫସଲରେ ୭-୮ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଶୀତ ଋତୁ ରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଅଖା ହାରା ଆଛାଦିକରଣ କରିବା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ରହୁଥିବା ଘରେ ଉତ୍ତାପ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହିଟର କିମ୍ବା ୨୦୦ ଖାଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

କୁହୁଡ଼ି ଓ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରୁ ପନିପରିବା କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ରେ ହାଲୁକା ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଉଳ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଟ୍ ଟାବଲେଟ୍ @ ୨ ର 3 ଟାବଲେଟ୍ / ଚନ୍ ଧାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାୟୁ ଟାଲର୍ ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଫାଙ୍କ ନ ଦେଇ ମୋଟା ଚାରପଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଫ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାବଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାକରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂତା ଥିଲିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ସୋରିଷ	ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ବଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦- ମିଲି ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ୧୫୦୦ PPM କୁ ୨୦୦ ଲିଟରପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ବଗ କୀଟ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ Thiamethoxam ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ Acetamiprid ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୬୦-ମିଲି Imidacloprid ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ମହୁମାଛି ମାନଙ୍କର ଚଳ ପ୍ରଚଳ ରେବାଧା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ଣ ସମୟରେ କୀଟନାଶକ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା	କପା ତୋଳିବା ପାଇଁ ସଫା କନା ମୁଣା ବାଷ୍ପେତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କପା ତୋଳିବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, କାଠି ଆଦି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅମଳ ହୋଇଥିବା କପା କୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ ବା ଚାରେପାଲିନ ପାଲ ଉପରେ ଚାଣ ଖରାରେ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ତୋଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୋଳା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ତୋଳା କପା କୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ରୁ ଅଧିକ କିସମ ର କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ କିସମ ଅନୁସାରେ ତୁଳା କୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ । କପା ରେ ଧୂଳି, ମାଟି, ପଲିଥିନ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ପିଆଜ	ପିଆଜତଳିଘରାରେ ଘରାକଟାରୋଗକୁ ରୋକିବାପାଇଁ, ନର୍ସରୀଶଯ୍ୟାକୁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ (ଧନୁଷ୍ଟିନ୍ / ବାଭିଷିନ୍) @ 2-ଗ୍ରାମ / ଲିଟରପାଣିକିମ୍ବା ମେଟାଲାଇଡ୍ରୋକ୍ସିମିଥାଲିନ (ରେଡୋମିଲ୍-ମିଲ୍ / କ୍ରିଲାଇଲ୍) @ 2.5 ଗ୍ରାମ / ଲିଟରପାଣି ସହିତ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ । ତଳିଘରାରେ ଥିବା ଅନାବାନା ଯାକ ସବୁ ହାତରେ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ପିଆଜତଳିଗୁଡ଼ିକ ୧୨ ରୁ ୧୫ ସେମି ଉଚ୍ଚାକିମ୍ବା କିମ୍ବା -ସପ୍ତାହର ହୋଇଗଲେ ମୁଖ୍ୟଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ପିଆଜତଳିରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ ଚନଶଢା ବୋରାକ୍ସିଡିନ, ୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଟ୍ରିଏସି, ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ମୁରିଆ, ୩୦ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ମ୍ୟୁରେଟ ଅଫ ଫସଫାଟ୍ ଏବଂ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ Sulphur ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୧୫ ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଉପରେ କାତଳି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ । ପିଆଜତଳି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର Pendimethalin ନାମକ ଘାସମରାଓଷଧ କିମ୍ବା ୦-ଗ୍ରାମ Oxyfluorfen ନାମକ ଘାସମରାଓଷଧକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଶୀତ ଋତୁରେ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦିନ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ସହ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡ଼ା ଲୁଣ, ଚୋକଡ଼ ଓ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।