



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 09-01-2024

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-09 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-10	2024-01-11	2024-01-12	2024-01-13	2024-01-14
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.0	28.0	28.0	27.0	27.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	12.0	13.0	12.0	11.0	11.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	79	75	80	54	39
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	29	30	32	27	15
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	4	5	6	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	112	120	68	112	120
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	2	2	0	0	0

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୮°C ଏବଂ ୧୧-୧୩ °C ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪-୬ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ରୁ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗ କୁ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୯-୮୦% ଏବଂ ୧୫-୩୨ % ରହିବା ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ

(୫-୧୧ ଜାନୁୟାରୀ) ରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୧୨ଜାନୁୟାରୀ ରୁ ୧୮ ଜାନୁୟାରୀ) ରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନ ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପିଆଜ ଫସଲରେ ଉଲ୍ଲୁଣିଆ ପୋକର ଆକ୍ରମଣର ନିରନ୍ତର ନୀରିକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । (ଟିପୋଲ୍ 1.0 ଗ୍ରାମ / ଲିଟର) କିମ୍ବା ତାଏଥେନ୍ M -45 @ 3 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ମଟର ଫସଲରେ ପୋଡର ସଠିକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2% ୟୁରିଆର ସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୁଗ	ସକାଳର କୁହୁଡିଆ ପାଗ ଏବଂ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦°C ହେଉଥିବାରୁ ମୁଗ ଫସଲ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଉ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୁଗ ଫସଲ ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଉ ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 600-ମି.ଲି. ନିମବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ 1500 PPM କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିସହ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଜଉ ପୋକ ର ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 40-ଗ୍ରାମ Thiamethoxam ବା 50-ଗ୍ରାମ Acetamiprid ନାମକ କୀଟନାଶକ ବା 60- ମି.ଲି. Imidacloprid ନାମକ କୀଟନାଶକ -200 -ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ ଦେଖାଯିବା ପରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଯେହେତୁ କୁହୁଡିଆ ପାଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି , ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଝେଟେଟେବଲ୍ ସଲଫର୍ 3ଗ୍ରାମ /ଲିଟର ସହିତ ସ୍ତେ କରିନ୍ତୁ । ଫୁଲର ଦେଖାଯିବା ପରେ ସର୍ବଦା ଅପରାହ୍ଣ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ତେ କରିନ୍ତୁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପରାଗସଂଗମ କାରୀ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ସକାଳୁ ସକ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ।

ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ମହ୍ୟ ପାଳନ	ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ ଫାସହ	ଜଳାଶୟ ରେ ଅତିକମରେ ୭ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଜଳ ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ । ଶୀତ ଋତୁରେ ମାଛ ବସନ୍ତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ଶିଫ୍ଟ ୧୦୦ମି.ଲି ପ୍ରତି ହେକଟୋର/ମିଟର କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶୀତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମାଛ ପାଳନ ପୋଖରୀରେ ଅପରାହ୍ଣ ୨ ଟାରେ ସମୁଦାୟ ମାଛର ଶରୀରର ଓଜନର @ 2% ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କୁକୁଡ଼ା	ଶୀତ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟର ଗ୍ରହଣର ଦୁଇ ଗୁଣ ପାଣି ପେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ଅନୁପାତ ୧:୫ ରଖନ୍ତୁ ।