



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୦୯.୦୧.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୦୨

ତାରିଖ ୦୯.୦୧.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୦୩

**ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୪.୦୧.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ – ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସଫା ରହିବ। ପବନର ବେଗ ୦୫-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୯ ଏବଂ ୦୯-୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସକାଳର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା ୩୨-୨୯% ଏବଂ ୧୫-୨୯% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି) (ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ))	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ))	ମେଘାଢ଼ ଙ୍କ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମା ଳ	୧୦-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୮	୧୧	୨	୭୭	୨୫	୫	୧୨୪
	୧୧-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୯	୧୧	୨	୭୩	୨୭	୫	୨୨୫
	୧୨-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୦	୦	୭୯	୨୯	୫	୧୫୩
	୧୩-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୦୯	୦	୫୭	୨୭	୭	୨୯୨
	୧୪-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୦୯	୦	୩୨	୧୫	୭	୨୦୨

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ନିମ୍ନ ତେଲ, ନିମ୍ନ ପିଡିଆ, ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜି କୁ ପ୍ରତି ୨୦-୨୫ ଦିନରେ @୧୦୦ଏମଏଲ/୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫୁଲ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ପୋକ ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
- ଧାନରେ ଲଲାଟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି, କଳିଙ୍ଗ ଧାନ, ମହାକିନୀ, ମାନସିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ତଳି ଭଲ ବଢିବା ଏବଂ ତେର ମାଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣିର ପତଳା ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ।
- ତଳିଘଲିରା କୁ ଅଣ୍ଟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣି ସାରିବା ରି ପରେ ତଳିଘେରା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତଗୁଣ୍ଡ ର ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ପକାନ୍ତୁ।
- କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୁ ଗରମ ପରିବେଶ ଦବାକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ।
- ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ, ଶୀତ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଫାଇଲ ଜାଗା କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ଧାନ-

- ଅବସ୍ଥା- ତଳିଘେରା

- ଧାନରେ ଲଲାଟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମୃଦ୍ଧି, କଳିଙ୍ଗ ଧାନ, ମହାକିନୀ, ମାନସିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବିଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଗଜା ଧାନକୁ କାଦୁଅ ଜମିରେ ବୁଣି କିମ୍ବା ଭୃମ୍ବ ସିତର ରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ତଳି ଭଲ ବଢିବା ଏବଂ ଚେର ମାଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣିର ପତଳା ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ।
- ତଳିଘଲିରା କୁ ଅଣ୍ଡା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣି ସାରିବା ରି ପରେ ତଳିଘେରା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତଗୁଣ୍ଡ ର ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ପକାନ୍ତୁ ।

ଟମାଟୋ:

- ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଣସି ଏକ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- Chlorantraniliprole ୧୮.୫% ଏସ.ସି@୮୦ ମିଲି/ଏକର କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ ୩୯.୫% S.C @୪୦ ମିଲି/ଏକର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ୧୪.୫% sc @୨୦୦ ମିଲି/ଏକର କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ହରଡ -

- ହରଡରେ ପ୍ଲମ୍ ମୋଥ ଦେଖା ଦେଲେ ତାକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପକ୍ଷୀ ବସିବା ପାଇଁ ବାଡି ଲଗାନ୍ତୁ ହେକ୍ଟର କୁ ୫୦ ଟି ହିସାବରେ
- ଅଜାଡିରଚଟିନ ୦.୦୩% **WSP** କୁ ୨୫୦୦-୫୦୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ ୩୦**EC** ୧୨୩୭ ଗ୍ରାମ/ହେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଇମାମେକଟିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ ୫% **SG** ୨୨୦ ଗ୍ରାମ/ହେକ୍ଟର ପକାନ୍ତୁ ।

ପତକୋବି:

- କୋବି ଫସଲରେ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬-୮ ଟି ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧-ଲିଟର ନିମ୍ନ ନି ଆଧାରିତରି କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
- ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଏହି କୀଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦-ଗ୍ରାମ **Flubendiamide** ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୮୦-ଗ୍ରାମ **Emamectin Benzoate** 5 % **SG** କୁ, 200- ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡା ଚାଷ :

- କୁକୁଡା ଚିଆଁ କୁ ଗରମ ପରିବେଶ ଦବାକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ, ଶୀତ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଫାଙ୍କ ଜାଗା କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
- କିଛି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିଆଁକୁ ଅଲଗା ରାଖି ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା କରଣ କରନ୍ତୁ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER