



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୧୨.୦୧.୨୦୨୪ (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist**

ସମ୍ବାହ ସଂଖ୍ୟା- ୦୨

**ତାରିଖ ୧୨.୦୧.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୦୪**

**ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୭.୦୧.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ – ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସକ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସଫା ରହିବ। ପବନର ବେଗ ୦୫-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୮ ଏବଂ ୧୧-୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସକାଳର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଶତକଡ଼ା ୫୭-୯୪% ଏବଂ ୨୦-୩୦% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି) (ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମା ତ୍ରା(°ସେ ଲସିୟସ)	ମେଘାଢ଼ କ (ଅଙ୍କୁ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମା ଳ	୧୩-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୨	୦	୭୦	୩୦	୫	୧୭୯
	୧୪-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୧	୦	୫୭	୨୫	୬	୧୯୫
	୧୫-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୧	୦	୬୬	୨୦	୫	୧୭୧
	୧୬-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୮	୧୨	୦	୯୧	୨୫	୫	୧୯୯
	୧୭-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୩	୪	୯୪	୨୯	୬	୧୭୩

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ମଟରରେ ପ୍ରୀସ୍ତ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଏହା ଫୁଲ ଆଉ କାଣ୍ଡ କୁ ଶୋଷୀ ଖାଇଦିଏ। ଏହାକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ROGER ୦.୦୩% କିମ୍ବା ମାଲାଥ୍‌ୟନ ୦.୧% ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ଧାନରେ ଲଲାଟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କଳିଙ୍ଗ ଧାନ, ମହାକିନୀ, ମାନସିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ତଳି ଭଲ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଚେର ମାଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣିର ପତଳା ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ।
- ତଳିଘଲିରା କୁ ଅଣ୍ଟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣି ସାରିବା ରି ପରେ ତଳିଘେରା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତଗୁଣ୍ଡ ର ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ପକାନ୍ତୁ।
- କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୁ ଗରମ ପରିବେଶ ଦେବାକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ ବଲ୍‌ ଲଗାନ୍ତୁ।
- ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ, ଶୀତ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଫାଇଲ ଜାଗା କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

ମଟର -

- ମଟରରେ ଥ୍ରୀପ୍ସ ପୋକ ଲାଗିଲେ ଏହା ଫୁଲ ଆଉ କାଣ୍ଡ ଏବଂ ଫଳକୁ ଶୋଷା ଖାଇଦିଏ। ଏହାକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ROGER ୦.୦୩% କିମ୍ବା ମାଲାଥ୍ରୟନ ୦.୧% ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- Azadirachtin 0.03% କିମ୍ବା NSKE 5% କୁ ଉପରୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।



ଥ୍ରୀପ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଧାନ-

- ଅବସ୍ଥା- ଡଳିଘେରା
- ଧାନରେ ଲଲାଟ, ସ୍ପର୍ଶ ସମୃଦ୍ଧି, କଳିଙ୍ଗ ଧାନ, ମହାକିନୀ, ମାନସିନୀ ଇତ୍ୟାଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବିଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ଗଜା ଧାନକୁ କାଦୁଅ ଜମିରେ ବୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତୁମ ସିତର ରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ଡଳି ଭଲ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଚେର ମାଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣିର ପତଳା ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ।
- ଡଳିଘଳିରା କୁ ଅଣ୍ଟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣି ସାରିବା ରି ପରେ ଡଳିଘେରା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତଗୁଣ୍ଡ ର ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ପକାନ୍ତୁ ।

ପତ୍ରକୋବି:

- କୋବି ଫସଲରେ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨-୮ ଟି ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରା ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧-ଲିଟର ନିୟ ନି ଆଧାରିତରି କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
- ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଏହି କୀଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦-ଗ୍ରାମ **Flubendiamide** ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୮୦-ଗ୍ରାମ **Emamectin Benzoate 5 % SG** କୁ, 200- ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଟମାଟୋ:

- ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଣସି ଏକ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- Chlorantraniliprole ୧୮.୫% ଏସ.ସି@୮୦ ମିଲି/ଏକର କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ ୩୯.୫% S.C @୪୦ ମିଲି/ଏକର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ୧୪.୫% sc @୨୦୦ ମିଲି/ଏକର କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ :

- କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୁ ଗରମ ପରିବେଶ ଦବାକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ, ଶୀତ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଫାଙ୍କ ଜାଗା କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ
- କିଛି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିଆଁକୁ ଅଲଗା ରାଖି ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା କରଣ କରନ୍ତୁ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER