



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୧୯.୦୧.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist**

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୦୩

**ତାରିଖ ୧୯.୦୧.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୦୭**

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୨୪.୦୧.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ହାଲୁକା ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୪-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୭-୨୮ ଏବଂ ୧୫-୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୮୩-୯୨% ଏବଂ ୩୫-୪୪% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ()	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମାଳ	୨୦-୦୧-୨୦୨୪	୨	୨୮	୧୭	୪	୮୮	୩୫	୫	୧୭୧
	୨୧-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୭	୩	୯୨	୩୫	୨	୧୮୯
	୨୨-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୫	୨	୮୫	୩୭	୪	୨୦୨
	୨୩-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୭	୪	୮୩	୪୨	୪	୧୮୦
	୨୪-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୭	୪	୯୧	୪୪	୫	୧୯୭

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ଗେଣ୍ଡୁରେ ମିଲି ବଗ ମାନେ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଗି ସେଥିରେ ମହୁ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯାହାକି ପତ୍ରକୁ କବକ ଭଳି ପରିଣତ କରାଏ।
- ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ କୁ ୨ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।
- ମଟରରେ କାଣ୍ଡ ବିକ୍ଷା ପୋକ ଦେଖା ଦେଲେ, **Azadirachtin ୦.୦୩% କୁ (୩୦୦ପିପିଏମ)** ହିସାବରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୩ ଥର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।
- ସୋରିଷ ରେ ଜଉ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ **Thiamethoxam** କିମ୍ବା କି ୫୦ ଗ୍ରାମ **Acetamiprid** କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ଆଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ୩ କେଜି ହିସାବରେ ବଡ଼ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- କିଛି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିଆକୁ ଅଲଗା ରାଖି ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା କରଣ କରନ୍ତୁ।

ଗେଣ୍ଡୁ ପୁଲ :

- ଗେଣ୍ଡୁରେ ମିଲି ବଗ ମାନେ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଗି ସେଥିରେ ମହୁ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଯାହାକି ପତ୍ରକୁ କବକ ଭଳି ପରିଣତ କରାଏ।
- ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ କିମ୍ବା ଡାଇମେଥୋଏଟ କୁ ୨ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।



ମଟର -

- ମଟରରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖା ଦେଲେ, **Azadirachtin ୦.୦୩% କୁ (୩୦୦ପିପିଏମ)** ହିସାବରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୩ ଥର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।



କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ

ଧାନ-

- ଅବସ୍ଥା- ରୋଇବା
- ୨୫-୩୦ ଦିନର ଗଛକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ୨୦*୧୫ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗୁଚ୍ଛ ରେ ୨-୩ ଟି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ।
- ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ (୨୧%) @୧୦କେଜି/ ଏକର ହିସାବରେ ଜିଙ୍କ ଅଭାବ ଥିବା ଜମିରେ ପକାନ୍ତୁ।

ସୋରିଷ:

- ସୋରିଷ ରେ ଜଉ ପୋକ ଦେଖା ଦେଲେ, ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମିଲି ନିୟତାତ କୀଟନାଶକ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ **Thiamethoxam** କିମ୍ବା କି ୫୦ ଗ୍ରାମ **Acetamiprid** କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ :

- କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଙ୍କୁ ଗରମ ପରିବେଶ ଦବାକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ ବଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ।
- ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ, ଶୀତ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଫାଇ ଜାଗା କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

- କିଛି ରୋଗ ଦେଖି ଦେଲେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିଆକୁ ଅଲଗା ରାଖି ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଟୀକା କରଣ କରନ୍ତୁ ।

ଗୋପାଳନ :

- ଶୀତ ଦିନରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ଆଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ବା କେଜି ହିସାବରେ ବଡ଼ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER