



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୨୭.୦୧.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୦୪

ତାରିଖ ୨୭.୦୧.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୦୮

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୦୧.୦୨.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କକ୍ଷମାଳ – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କକ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘଢ଼ଳ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୫-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୪-୨୭ ଏବଂ ୧୦-୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୬୮-୭୨% ଏବଂ ୧୯-୩୩% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ()	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଢ଼ଳ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କକ୍ଷମାଳ	୨୮-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୪	୧୦	୨	୭୦	୧୯	୫	୧୫୮
	୨୯-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୫	୧୧	୩	୭୦	୨୦	୫	୧୫୮
	୩୦-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୬	୧୨	୨	୭୨	୨୦	୫	୨୦୨
	୩୧-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୬	୧୩	୩	୬୮	୨୭	୬	୧୯୮
	୦୧-୦୨-୨୦୨୪	୦	୨୭	୧୩	୩	୭୨	୩୩	୬	୨୩୪

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ମଟରରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖା ଦେଲେ, Azadirachtin ୦.୦୩% କୁ (୩୦୦ପିପିଏମ) ହିସାବରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୩ ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
- ସୋରିଷରେ ଜଉ ପପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟନର ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ Thiamethoxam କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ Acetamiprid କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଗେଣ୍ଡୁ ରେ ଧଳା ରୋଗ(powdery mildew) ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, Sulfex @୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ଚେଲ ପିଠିଆ ଆଦି ଗୋଷାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ୩ କେଜି ହିସାବରେ ବଡ଼ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଠିକ ରହିବ ।
- ରୋଗିଣୀ ଚିଆକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ ଓ ବାକି କୁ ଚୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ।

ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ :

- ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଗେଣ୍ଡୁ ରେ ଧଳା ରୋଗ(powdery mildew) ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, Sulfex @୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ମଟର

- ମଟରନର କାଣ୍ଡ ବିକ୍ଷା ନପାକ ନଦଖା ନଦନଲ, Azadirachtin ୦.୦୩% କୁ(୩୦୦ପିପିଏମ) ହିସାବନର ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନ ବୟବଧାନନର ୩ ଥର ନରେ କରନ୍ତୁ।

ସୋରିଷ:

- ସୋରିଷରେ ଜଉ ପପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟନର ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ Thiamethoxam କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ Acetamiprid କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ହଳଦୀ:

- ଅବସ୍ଥା- ଅମଳ
- ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ବିଲରେ ପାଣି ମଡେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ମାଟି ଆପେ ଓଦା ହେଇ ନରମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ହଳଦୀ ଖୋଲିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଗୋପାଳନ :

- ଶୀତ ଦିନରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ତେଲ ପିଡିଆ ଆଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ୩ କେଜି ହିସାବରେ ବଡ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡା ଚାଷ -

- କୁକୁଡା ଚିଆଙ୍କୁ ଗରମ ପରିବେଶ ଦବାକୁ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଲାଇଟ ବଲ୍‌ବ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ, ଶୀତ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଫାଙ୍କ ଜାଗା କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER