



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୩୦.୦୧.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୦୫

ତାରିଖ ୩୦.୦୧.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୦୯

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୦୪.୦୨.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷମାଳ – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଆକାଶ ସଫା ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘଚ୍ଛନ୍ଦ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୫-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୩-୨୫ ଏବଂ ୧୦-୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୩୫-୭୮% ଏବଂ ୧୮-୨୨% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ()	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କ୍ଷମାଳ	୨୮-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୫	୧୦	୨	୭୯	୨୦	୭	୨୦୨
	୨୯-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୫	୧୧	୨	୭୮	୨୩	୭	୨୦୨
	୩୦-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୩	୧୦	୪	୭୮	୨୨	୭	୨୦୨
	୩୧-୦୧-୨୦୨୪	୦	୨୩	୧୦	୦	୫୨	୨୨	୭	୨୮୫
	୦୧-୦୨-୨୦୨୪	୦	୨୩	୧୧	୦	୩୫	୧୮	୫	୧୨୧

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ହଳଦୀ କୁ ଅମଳ କରିବାର ୨-୩ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତୁ।
- କଞ୍ଚା ହଳଦିକୁ ଛାଇ ରେ କିମ୍ବା କାଠଗୁଣ୍ଡ/ନଡ଼ିଆକଟା ରେ ଗୁଡେଇ ରଖନ୍ତୁ।
- ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଗେଣ୍ଡୁ ରେ ଧଳା ରୋଗ(powdery mildew) ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, Sulfex @୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ମଟରକୁ ଫଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ମଡ଼କ୍ତ ନହେଲେ ଗଛ ହଳଦିଆ ହୋଇ ଶୁଖିଯିବ।
- ସୋରିଷରେ ଜଉ ପଯୋକ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟନର ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ Thiamethoxam କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ Acetamiprid କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ଆଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ୩ କେଜି ହିସାବରେ ବଡ଼ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଠିକ ରହିବ।

ହଲଦୀ:

- ଅବସ୍ଥା- ଅମଳ
- ହଲଦୀ କୁ ଅମଳ କରିବାର ୨-୩ ଦିନ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରନ୍ତୁ ।
- କଞ୍ଚା ହଲଦୀକୁ ଛାଇ ରେ କିମ୍ବା କାଠଗୁଣ୍ଡ/ନଡ଼ିଆକଟା ରେ ଗୁଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ।

ମଟର:

- ମଟରକୁ ଫଳନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ମଡ଼କ୍ତ ନହେଲେ ଗଛ ହଲଦିଆ ହୋଇ ଶୁଖିଯିବ ।
- ମଟରନର କାଣ୍ଡ ବିକ୍ଷା ନପାକ ନଦଖା ନଦନଲ, Azadirachtin ୦.୦୩% କୁ(୩୦୦ପିପିଏମ) ହିସାବନର ପ୍ରତି ୧୫ ଦିନ ବୟବଧାନନର ୩ ଥର ନରେ କରନ୍ତୁ ।

ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ:

- ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଗେଣ୍ଡୁ ରେ ଧଳା ରୋଗ(powdery mildew) ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, Sulfex @୩ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶେଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ:

- ସୋରିଷରେ ଜଉ ପପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଲେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟନର ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ Thiamethoxam କିମ୍ବା ୫୦ ଗ୍ରାମ Acetamiprid କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଗୋପାଳନ:

- ଶୀତ ଦିନରେ ନିଜ ଦେହକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
- ମକା, ଗହମ ଓ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ ଆଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ କୁ ଦୈନିକ ୩ କେଜି ହିସାବରେ ବଡ଼ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER