



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -01

ତାରିଖ-05.01.2024

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପବନ ର ବେଗ 4-6 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 26-27 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10-12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	06-01-2024	1	27	10	3	67	35	6	124
	07-01-2024	1	26	11	4	71	36	5	124
	08-01-2024	0	26	12	1	72	37	5	120
	09-01-2024	0	26	12	4	65	38	4	199
	10-01-2024	0	26	12	2	71	38	4	158

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

- ଜମି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ, ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ କାଟିଲା ପରେ ଖରାରେ ସୁଖେଇଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବିଲରେ ପଡିଥିବା ନଡାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

- ନଡ଼ାକୁ ଜିଆଖଟ ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ ଏବଂ ଚୋରିଆ:

- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ସୋରିଷରେ ଧଳା ରଞ୍ଜ (White rust) କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Metalaxyl + Mancozeb (Ridomil MZ) @ 0.2% ମାତ୍ରା ରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୂଗ:

- ଧଳା ମାଛି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସିଡାମିପ୍ରିଡ (Acetamiprid) 20 SP @ 250 gm/ha ଗଛରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Acetamiprid 20% SP @ 20gm/acre ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନ :

- ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଧାନର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ରଞ୍ଜିତା ସ୍ଥାନ ରେ Aluminium phosphide @ 3 ଟାଙ୍କେଟ୍ସ ପ୍ରତି ଚନ ରଖନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା :

- **ପିଆଜ:**
- ପିଆଜରେ ପାତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Mancozeb କିମ୍ବା Copper oxychloride @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- **ପୋଟଳ:**
- ପୋଟଳ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Metalaxyl+Mancozeb @ 400 g ପ୍ରତି ଏକର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବନ୍ଧାକୋବି:

- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲକୋବି:

- ଜଉପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 25 ଟି ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ।
- ହାତରେ ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
- ଦେହଳୀ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି Thiomethoxam 25% WG @ 80g କିମ୍ବା Acetamiprid 20% SP @ 30g, 200 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଲଙ୍କା:

- ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:

ଗେଣ୍ଡୁ:

- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- 30 ଦିନ ପରେ ଗଛର ଅଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଶାଖା ଅଧିକା ଆସିବ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଗୋଲାପ:

- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lit କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ପଶୁ ପାଳନ:

କୁକୁଡା ପାଳନ:

- କୁକୁଡା ଚିଆଁ କୁ ଟୀକାକରଣ ନ କରେଇଥିଲେ, କରେଇଦିଅନ୍ତୁ।
- ଶୀତଳହରି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁକୁଡା ଘରକୁ ଚାରି ପଟରୁ ଘୋରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

ଗାଈ ପାଳନ:

- ଗୁହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- ପିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଅଣ୍ଡା ପବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଉଷ୍ମତା ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)