



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -04

ତାରିଖ-24.01.2024

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **ଅତି ହାଲୁକା ରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି**। ପବନ ର ବେଗ **4-5** କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା **16-26** ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା **11-14** ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	25-01-2024	12	16	14	8	96	81	5	90
	26-01-2024	0	22	14	6	87	45	5	115
	27-01-2024	0	25	12	3	75	35	4	154
	28-01-2024	0	25	11	1	68	40	5	120
	29-01-2024	0	26	11	1	74	34	4	158

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ **ଅତି ହାଲୁକା ରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି**।

- ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜଳ ସେଚନ କୁ ଛାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ରେ ଅଧିକ ଜଳ ହୋଇଗଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

- କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ରବି ଫସଲ ଲଗେଇବା ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଷା କୁ ନଜର ରଖି, ଜଉ ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid କିମ୍ବା Dimethoate ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ ଏବଂ ଚୋରିଆ:

- କ୍ଷେତ ରେ ଘାସ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ କୋଡା ଖୋସା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପତ୍ର ରୋଗ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଗଲେ, Carbendazim+ Mancozeb ଓ Hexaconazole କିମ୍ବା Chlorothalonil @ 2 g/ltr ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଫୁଲ ଦେବା ସମୟରେ Urea ସାର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ ହିସାବ ରେ ପକାନ୍ତୁ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ:

- ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ Borax 10% @ 2 g/ltr ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଭଲଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ।
- ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଳ ସିଂଚନ ର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠି Agri aqua gel ଏକର ପ୍ରତି 1-2 kg ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଦୀ ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Acephate ଓ Imidachloprid @ 1-2 g/ltr ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପେଟି :

- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ Urea ର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତୁ ।
- ଭଲ ର ଦମନ ପାଇଁ Chloropyrifos ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷେତ ରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।

ପରିପତ୍ତି :

ଫୁଲକୋବି:

- ଫଲ ଆର୍ମ୍ ଝର୍ମ କିମ୍ବା ଫଲ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 25 ଟି ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ।
- ଦେହଳୀ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି Thiomethoxam 25% WG @ 80g କିମ୍ବା Acetamiprid 20% SP @ 30g/200 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ବନ୍ଧାକୋବି:

- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପାଳଙ୍ଗ:

- ପତ୍ରଦାଗ ଦେଖା ଗଲେ Mancozeb କିମ୍ବା Carbendazim @ 1-2 g/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଲଙ୍କା:

- ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ବାଇଗଣ:

- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟ ରେ କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗେଇବା ର 15 ଦିନ ପରେ, Borax @ 35 mg ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ମାଟି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଘାସ ହେଇଥିଲେ, ବାଛିକି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ।

ଟମାଟୋ:

- ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।

- ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:

- **ଗେଣ୍ଡୁ:**
- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- 30 ଦିନ ପରେ ଗଛର ଅଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଶାଖା ଅଧିକା ଆସିବ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପଶୁ ପାଳନ:

- **କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ:**
- କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ କୁ ଚୀକାକରଣ ନ କରେଇଥିଲେ, କରେଇଦିଅନ୍ତୁ।
- ଶୀତଳହରି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଚାରି ପଟରୁ ଘୋରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)

