



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -05

ତାରିଖ- 30.01.2024

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **2 ତାରିଖ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି**। ପବନ ର ବେଗ **6-9** କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା **25-28** ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା **10-13** ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	31-01-2024	0	28	13	4	86	35	8	167
	01-02-2024	0	28	13	1	86	33	8	163
	02-02-2024	4	26	10	7	91	38	9	191
	03-02-2024	0	25	10	0	72	28	9	288
	04-02-2024	0	27	12	0	55	24	6	72

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ **ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହିତ ଶୀତ ଲହରୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ**।

- ଶୀତଲହରି ରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
- ପନିପରିବା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
- Aluminium Phosphide (Celphos ଟାବ୍ଲେଟ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ।

- ଜଉ ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid କିମ୍ବା Dimethoate ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପେଣୀ :

- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ Urea ର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଉଇ ର ଦମନ ପାଇଁ Chloropyriphos ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।

ସୋରିଷ:

- ଫୁଲ ଦେବା ସମୟରେ Urea ସାର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ ହିସାବ ରେ ପକାନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ରେ ଘାସ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ କୋଡା ଖୋସା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ପତ୍ର ରୋଗ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଗଲେ, Carbendazim+ Mancozeb ଓ Hexaconazole କିମ୍ବା Chlorothalonil @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ:

- ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ Borax 10% @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ଭଲଭାବରେ ହୋଇଥାଏ।
- ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଛ୍ୱାଣିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Acephate ଓ Imidachloprid @ 1-2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପନିପରିବା :

- **ଲଙ୍କା:**

- ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ଫମାଟୋ:**

- ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ବାଇଗଣ:**

- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟ ରେ କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗେଇବା ର 15 ଦିନ ପରେ, Borax @ 35 mg ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ଫୁଲକୋବି:**

- ଫଳ ଆର୍ମ୍ ଝର୍ମ କିମ୍ବା ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 25 ଟି ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ।

- **ବନ୍ଧାକୋବି:**

- କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ପାଳଙ୍ଗ:**

- ପତ୍ରଦାଗ ଦେଖା ଗଲେ Mancozeb କିମ୍ବା Carbendazim @ 1-2 g/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

- **ଫୁଲ:**

- **ଗୋଲାପ:**

- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lt କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

- **ଗେଣ୍ଡୁ:**

- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- 30 ଦିନ ପରେ ଗଛର ଅଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଶାଖା ଅଧିକା ଆସିବ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/ltr ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଚିପ୍ସ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)