



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 02-01-2024

ରାଜନଗର(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-02 ( ଆସକା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-05	2024-01-06	2024-01-07
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	30.0	30.0	29.0	29.0	29.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	15.0	16.0	17.0	18.0	18.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	91	79	79	75	74
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	25	27	24	27	24
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	5	5	6	6
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	155	156	159	159	153
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ)	0	1	1	5	3

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ , ଶନିବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 29.0 °C-30.0 °C ରହିବ | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15.0 °C-18.0 °C ରହିବ | ପବନର ବେଗ 5.0-6.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ | ପୂର୍ବାହ୍ନ (74-91%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (24-27%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

### ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ତଳିଘରା କୁ ଅଳ୍ପ ଦାଉ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ତଳିଘରା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତ ଗୁଣ୍ଡର ଏକ ପତଳାଆସ୍ତରଣ ପକାନ୍ତୁ । ତଳିଘରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୋରଖେଲ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିଆ ପାଣି କାଟିଦେବି ମାଟିକୁ ଓଦାରଖନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଘରା କୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପଲିଥିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡେଇ ରଖନ୍ତୁ ।

### ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ନର୍ସରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସରୀ ଶଯ୍ୟା ଚାରି ପାଖରେ କ୍ଲୋରୋପିରିଫୋସ୍ ପାଉଡର ଲଗାନ୍ତୁ ।

### ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଡାଲୁଅ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳ କ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ଯଥା ସତ୍ୟଭାମା, ସହଭାଗୀ ଧାନ, ମହାକିନୀ, ମନସ୍ୱିନୀ, ତିଆରଥାର -୪୨, ତିଆରଥାର -୪୩, ତିଆରଥାର -୪୪, ବୀଣା-୧୧, ଜିବି-ବି୧, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ଏମଟିୟୁ-୧୦୧୦, ଏମଟିୟୁ-୧୦୦୧, ନବୀନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟା ଇତ୍ୟାଦି ଧାନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ୨୦ କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋ ଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନ ରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ ନାମକ ଫିଫିନାଶକ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିନ ଏବଂ ଥିରାମ ର ମିଳିତ ଫିଫିନାଶକ କୁ ମିଶାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
ସୋରିଷ	ସୋରିଷ ଫସଲରେ କରତିଆ ମାଛି ଓ ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ସୋରିଷ ଫସଲରେ କରତିଆ ମାଛି ଓ ପତ୍ରଛନ୍ଦା ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦-ମିଲି Ethofenprox ନାମକ କୀଟନାଶକ ଯାହାକି Bombard ବା Primo ନାମ ରେ ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ୪୦୦- ମିଲି Chlorpyrifos ଏବଂ Cypermethrin ର ମିଳିତ କୀଟନାଶକ ଯାହାକି Lethal-505 ବା Super D ନାମ ରେ ମିଳୁଛି, ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଫୁଲକୋବି	କୋବି ଫସଲରେ ବୋରନ ଅଣୁସାର ଜନିତ ନି ଗଠନଗତ ସମସ୍ୟା ର ପରିଚା ରି ଲନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୪ କିଲୋ କି ଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ କୁ ଶେଷ ଓତ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଓତ ଚାଷ ସମୟରେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ଥିଲେ ଚାରା ରୋପଣ ର ୨ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏବଂ ଫୁଲ କଢ ଧରିବା ରି ର ୨ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବ ପୂ ରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ କିମ୍ବା କି ୧-୧.୫ ଗ୍ରାମ ଫୋଲିବୋର କିମ୍ବା କି ସୋଲୁବୋର ମିଶାଇ ପତ୍ର ରେ ସିଂ ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ପିଆଜ	ପିଆଜ ତଳି ଘରା ରେ ଘରାକଟା ରୋଗ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ନର୍ସରୀ ଶଯ୍ୟା କୁ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ (ଧନୁଷ୍ଟିନ / ବାଭିଷ୍ଟିନ) @ 2-ଗ୍ରାମ / ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା ମେଟାଲାକ୍ସିକ୍ଲାନକୋଜେକ୍ (ରେଡୋମିଲ୍-ମିକ୍ / କ୍ରିଲାକ୍ସିଲ) @ 2.5 ଗ୍ରାମ / ଲିଟର ପାଣି ସହିତ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ପାଣି ରେ ପକାନ୍ତୁ ।

**ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଓଦା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଭିଜାଯାଇଥିବା ନଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଶୁଖାନ୍ତୁ । ପଶୁମାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଏହାର ଚଟାଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ପଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିମୋନିଆ, ଜ୍ୱର, କୋକ୍ସିଡ଼ିଓସିସ୍ ଏବଂ ଏପରିକି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଶୀତଦିନେ ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।