



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



# କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 19-01-2024

ରାଜସ୍ୱ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-01-19 ( ଆସକା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-01-20	2024-01-21	2024-01-22	2024-01-23	2024-01-24
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	30.0	30.0	31.0	31.0	30.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	17.0	17.0	17.0	16.0	16.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	90	92	90	93	96
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	31	31	39	41	46
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	6	4	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	162	163	171	158	153
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	1	2	3	2	1

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଶନିବାର ଦିନ ରୁଧିରା ଦିନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ ଏବଂ ରବିବାର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।  
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 30.0 ° C-31.0 ° C ରହିବ | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 16.0 ° C-17.0 ° C ରହିବ | ପବନର ବେଗ 3.0-7.0  
କିଲୋମିଟର ରହିବ | ପୂର୍ବାହ୍ନ (90-96%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (31-46%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

### ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ବିଶୋଧିତ ଗଜା ଧାନକୁ କାନ୍ଥରେ ଜମିରେ ବୁଣାବୁଣି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପ ସିତର ରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ତଳି ଭଲ ବଜିବା ଏବଂ ତେର ମାଟିକୁ ଧରିବା ରି  
ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣିର ପତଳା ସ୍ତର ରଖନ୍ତୁ । ତଳିଘଳିରା କୁ ଅଣ୍ଟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରି ପାଇଁଧାନ ବୁଣି ସାରିବା ପରେ ତଳଘରା ଉପରେ  
ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଖତଗୁଣ୍ଡ ର ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ପକାନ୍ତୁ । ତଳିଘଳିରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୋରଝେଲ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ  
କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିଆ ପାଣି କାଟି ଦେଇ ମାଟି କୁ ଓଦା ରଖନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିଘଳିରା କୁ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପଲିଥିନ  
ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡାଲ ରଖନ୍ତୁ ।

### ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ମହୁମାଛି ମାନକ ର ତଳପ୍ରତଳ ରେ ବାଧା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ରେ କୀଟନାଶକ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।ସର୍ବଦା ଘାସମରା ଔଷଧ  
କୁ ସଫା ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ଫୁଟ ଫ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ଜେଟ ନୋଜଲ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୋୟର ରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

### ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶିକ୍ଷା	ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଧାନ	ଯଦି ସଂରକ୍ଷିତ ଚାଉଳ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଲିଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ @ ର 3 ଟାବଲେଟ୍ / ଚନ୍ ଧାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବାୟୁ ଟାଲର୍ ପାତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଫାଙ୍କ ନ ଦେଇ ମୋଟା ଚାରପଲିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଇ ଫ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ । ଟ୍ୟାବଲେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାକରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂତା ଥଳିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫ୍ୟୁମିଗେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ମସୁର/ ହରଡ଼	ହରଡ଼ ଫସଲ ରେ ଛୁଇଁ ବିନ୍ଧା କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲୋରପିରିଫୋସ୍ 50% + ସାଇପର୍ମେଥ୍ରିନ୍ 5% ଇସି (ପ୍ରେମେନ୍ସୁପର / ସୁପର 505) @ 400- ମିଲି / ଏକର କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ୍ 50% ଇସି (ପ୍ରହର / ସେଲକ୍ରନ୍) @ 400-ମିଲି / ଏକର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଅମୃତଭଣ୍ଡା	ଅମୃତଭଣ୍ଡାରଦହିଆପୋକନିମତ୍ତେ ୧ ଠଲିଚରପାଣିରେ ୩୦ ମିଲିନିମ୍ବତେଲ ୧୫୦ ଠିପିଏମପ୍ରୟୋଗକରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକଆକ୍ରାନ୍ତଅଞ୍ଚଳରେହେକ୍ଟରପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମିଲିପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ୍ ୫୦ % ଇସିକିମ୍ବା ୧୦୦ଗ୍ରାମଥାୟୋମେଥୋକ୍ଟମ ୨୫%ଡବ୍ଲୁଜିପ୍ରୟୋଗକରନ୍ତୁ ।

**ମସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ମସ୍ୟ ପାଳନ	ମସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ କାର୍ପ	ଶୀତ ଋତୁରେ ମାଛ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ କବକ, ବୀଜାଣୁ ଓ ପରଜୀବୀ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ମାନଙ୍କରନିରାକରଣ ପାଇଁଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବ ରୁ ଏକ ଏକର ପୋଖରୀ ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲି CIFAX କିମ୍ବା ୧ ରୁ ୨ କେଜିପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ କିମ୍ବା ୫୦ ରୁ ୧୦୦ କେଜି ରୁନ ଫିଶାଲ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଶୀତ ଋତୁରେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗନହେବା ପାଇଁଏକ ଏକର ପୋଖରୀ ପ୍ରତି ୧୦୦ କେଜି ଲୁଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।