



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 09-02-2024

ଅଙ୍ଗୁଳ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-02-09 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-02-10	2024-02-11	2024-02-12	2024-02-13	2024-02-14
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	31.0	31.0	30.0	30.0	31.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	11.0	12.0	14.0	14.0	13.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	68	56	49	55	70
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	22	20	21	23	21
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	6	6	6	7	8
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	112	112	144	124	112
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଞ୍ଚୁ)	0	1	6	7	4

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକତଃ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ରୁ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦-୩୧°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୧-୧୪°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ୬-୮ କି.ମି/ଘ ବେଗରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ମୁଖ୍ୟତଃ ୪୯-୭୦% ଏବଂ ୨୦-୨୩% ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଧାନ ସାଇତି ରଖିବା ବସ୍ତା କିମ୍ବା କୋଠରୀରେ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ aluminum phosphide ଟାବଲେଟ୍ ଏକ ଟନ ପିଛା ତିନି ଟାବଲେଟ୍ କମ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବେ tarpaulin ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି କିଛି ଫାଙ୍କ ବାଟ ନ ରୁହେ, କୋଠରୀ ସହି ଜାଗା କିମ୍ବା କବାଟ ତଳ ଫାଙ୍କରେ tarpaulin ଚାରି ପଟେ ସେଲୋ ଟେପ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବାଷ୍ପ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ, ୭-୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ବା ବସ୍ତା ର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏ ଭଳି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶୋରିଷ ଫସଲରେ ର କରଡିଆ ମାଛି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ Profigan ୨ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ବୁଣିବା ର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଶୁଭ ଏବଂ ସ୍ମାରକ ଭଳି ଉର୍ଜିତ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଅମଳ ପାଆନ୍ତୁ

ମୋବାଇଲରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୁଗ	ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗ ଫସଲରେ ସହେବି ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡି ନଷ୍ଟ କରାଯିବ । ଏକର ପ୍ରତି 20-ଟି ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ । ରୋଗ ର ବାହକ ଧଳା ମାଛି

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
	ର ରାସାୟନିକ ଉପାୟ ରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 40-ଗ୍ରାମ Thiamethoxam ନାମକ କୀଟନାଶକ ବା 50-ଗ୍ରାମ Acetamiprid ବା 200-ମିଲି Pyriproxifen -200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। (ଆସକ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ)
ବାଦାମ	ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ରେ ଟୀକ୍ସା ରୋଗ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ Pyraclostobin 20% WG ୧ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର କିମ୍ବା Tebuconazole 25% WG ୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୋୟାଗ କରନ୍ତୁ (ଆସକ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ)

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଫାଟୁଆ ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୭ ମାସ ରେ ଥରେ ଟୀକା କାରଣ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ରେ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟୀକା କାରଣ କରନ୍ତୁ

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ	ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ ଫିସ୍	ମାଛ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ର ଗୁଣବତ୍ତା କୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥି ପାଇଁ ପାଣି ର ପି.ଏଚ୍-୭.୫ ରୁ ୮.୫, ଦ୍ରାବିତ ଅମ୍ଳଜାନ-୫.୦ ppm , ତାପମାତ୍ରା- ୨୫-୩୦°C ଏବଂ କ୍ଷାରତା-୭୫-୧୨୫ ppm ଏବଂ ଭାରି ଜଳାୟତା -୭୫-୧୫୦ ରହିବ ଆବଶ୍ୟକ