



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 02-02-2024

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-02-02 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-02-03	2024-02-04	2024-02-05	2024-02-06	2024-02-07
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	29.0	30.0	30.0	29.0	29.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	20.0	19.0	19.0	20.0	20.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	78	81	87	87	83
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	41	32	37	40	39
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	8	6	7	10	11
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	180	198	189	180	202
ମେଘାଚ୍ଛନ (ଅଙ୍କ)	2	0	0	0	0

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଂଶିକ ମେନ୍ସୁଆ ଆକାଶ ସହିତ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଷ୍କା ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 6-11 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ 29.0-30.0 ° C ରୁ 19.0-20.0 ° C ମଧ୍ୟରେ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ 78-87% ରୁ 39-41% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା ର ତଳି ରୋଗ ଥିଲେ ରାତିର କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ତଳିକୁ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଦାମ	ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଥିବା ବାଦାମରେ ଜିପସମ୍ @ 200 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଏକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପତ୍ର ଲେଣ୍ଡି ପୋକ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ଆଜାଦିରାଫ୍ଟିନ୍) 300 ପିପିଏମ୍ @ 1-ଲିଟର / ଏକର ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୋନୋଫୋସ୍ 50% EC @ 400 ମିଲି / ଏକର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରପିରିଫୋସ୍ 50% + ସାଇପର୍ମେଥ୍ରିନ୍ 5% ଇସି @ 400 ମିଲି / ଏକର 200-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
କୁଷୁର ବିନ	କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 15 lt ପାଣିରେ ଆଜୋକ୍ସିସ୍ତ୍ରୋବିନ୍ + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 15 ମିଲି ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଗ ଡାଳଟି ଝାଉଁଳି ପତେ ଓ ପରେ ଏହି ଝାଉଁଳି ଥିବା ଡାଳଟି ଶୁଖିଯାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦-ମିଲି ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
କାଓପିଇ	କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିନ ଫସଲ ରେ ପାଉଁଶିଆ ପତ୍ର ରୋଗ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 30 ଗ୍ରାମ୍ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ 8% + ମାନକୋଜେବ 64% ସହିତ ଥିଏମେଟୋକ୍ସାମ 3 ଗ୍ରାମ୍ 14 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଛେଳି	ଛେଳି ମେଣ୍ଡା କ୍ ଏ. ପି. ଆର. , ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଆଦିର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଟୀକାକରଣ କରେଇନେବା ଦରକାର