



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -05

ତାରିଖ- 02.02.2024

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।** ପବନ ର ବେଗ 5-8 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା **27-28** ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା **15-17** ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	03-02-2024	1	27	17	4	66	41	6	68
	04-02-2024	0	27	16	0	81	29	5	124
	05-02-2024	0	28	15	0	91	26	6	112
	06-02-2024	0	27	16	2	95	41	8	146
	07-02-2024	0	27	17	4	91	37	8	198

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ **ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।**

- ପନିପରିବା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- Aluminium Phosphide (Celphos ଟାଙ୍କେଟ) ବ୍ୟବହାର କରି ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ।

- ଜଉ ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid କିମ୍ବା Dimethoate ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବୁଟ:

- ବୁଟ ରେ ପାତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2.5 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dithane- M 45 @ 2.5 g/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଜମି ରେ ଅଧିକ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ପେଣୀ :

- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ Urea ର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଭଲ ର ଦମନ ପାଇଁ Chloropyrifos ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷେତ ରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ:

- ଫୁଲ ଦେବା ସମୟରେ Urea ସାର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ ହିସାବ ରେ ପକାନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷେତ ରେ ଘାସ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ କୋଡା ଖୋସା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପତ୍ର ରୋଗ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଗଲେ, Carbendazim+ Mancozeb ଓ Hexaconazole କିମ୍ବା Chlorothalonil @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା :

- **ବାଇଗଣ:**
- ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଭଲ୍ଲୁଣିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Phosphamidon 40% SL @ 1.5 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗେଇବା ର 15 ଦିନ ପରେ, Borax @ 35 mg ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ବାଇଗଣରେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଦେଖା ଗଲେ Methyl Demeton 30 EC @ 1 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲକୋବି:

- Diamond back moth ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Cartap hydrochloride @ 1 g/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଫଳ ଆର୍ମ୍ ଓ ଫଳ କିମ୍ବା ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 25 ଟି ଆଲୋକ ଜଳ ବସାନ୍ତୁ।

ବନ୍ଧାକୋବି:

- କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Dimethoate 30% EC @ 6 ml/10 lt କିମ୍ବା Malathion 50% EC @ 1.5 ml/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଲଙ୍କା:

- ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଟମାଟୋ:

- ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:

ଗୋଲାପ:

- ଗୋଲାପରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lt କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଗେଣ୍ଡୁ:

- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- 30 ଦିନ ପରେ ଗଛର ଅଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଶାଖା ଅଧିକା ଆସିବ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପଞ୍ଜୀ ପାଳନ:

- **ଗାଳ:**
- ଗାଳ ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ପିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଗୁହାଳ ଘର କୁ ସିତଲହରୀ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଚିପ୍ସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)