



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -07

ତାରିଖ- 13.02.2024

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **ଅତି ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।** ପବନ ର ବେଗ **5-9** କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା **27-30** ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା **14-17** ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	14-02-2024	0	30	16	3	68	30	9	162
	15-02-2024	4	29	17	6	69	29	7	79
	16-02-2024	16	27	17	8	76	27	7	68
	17-02-2024	2	29	15	6	62	31	5	79
	18-02-2024	0	30	14	4	69	30	6	153

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ **ଅତି ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।** 16 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟମଧରଣ ର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

- କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।

- ବନ୍ଧ ବନେଇ ଜଳ ସରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- ଜମିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଥିଲେ ନିଷ୍କାସନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ପନିପରିବା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
- Aluminium Phosphide (Celphos ଟାବ୍ଲେଟ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।

ସୋରିଷ:

- ଫୁଲ ଦେବା ସମୟରେ Urea ସାର ଚପ ଡ୍ରେସିଂ ହିସାବ ରେ ପକାନ୍ତୁ।
- ଜଳ ସେଚନ କୁ 3-5 ଦିନ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।
- ପତ୍ର ରୋଗ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଗଲେ, Carbendazim+ Mancozeb ଓ Hexaconazole କିମ୍ବା Chlorothalonil @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ବୁଟ:

- ବୁଟ ରେ ପାତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2.5 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dithane- M 45 @ 2.5 g/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଜମି ରେ ଅଧିକ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପେଣି :

- ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ Urea ର ଚପ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଭଲ ର ଦମନ ପାଇଁ Chloropyriphos ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ପନିପରିବା :

ଫୁଲକୋବି:

- Diamond back moth ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Cartap hydrochloride @ 1 g/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଫଳ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କିମ୍ବା ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 25 ଟି ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ ।

ବନ୍ଧାକୋବି:

- କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyrifos @ 2 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ବାଇଗଣ:

- ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଉଜୁଣିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Phosphamidon 40% SL @ 1.5 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଇଗଣ ରେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଦେଖା ଗଲେ Methyl Demeton 30 EC @ 1 ml/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଲଙ୍କା:

- ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଟମାଟୋ:

- ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
- ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଫୁଲ:

ଗୋଲାପ:

- ଗୋଲାପ ରେ ମିଳି ବଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Parathion @ 2 ml/lit ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl demeton 25 EC @ 2 ml/lit କିମ୍ବା Carbofuran 3G @ 5 g ପ୍ରତି ଗଛ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଗେଣ୍ଡୁ:

- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- 30 ଦିନ ପରେ ଗଛର ଅଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ଶାଖା ଅଧିକା ଆସିବ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/ltr ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପଶୁ ପାଳନ:

- **ଗାଈ:**
- ଗାଈ ଏବଂ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ପିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଗୃହାଳ ଘର କୁ ସିଂଚନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।

- **କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ:**
- ଚିଆଁ ଟୀକାକରଣ ନ କରିଥିଲେ କରେଇଦିଅନ୍ତୁ।
- ଚିଆଁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପିବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)

