



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -08

ତାରିଖ- 23.02.2024

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ହାଲୁକା ରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନ ର ବେଗ **6-10** କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା **29-32** ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା **19-21** ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	24-02-2024	2	31	19	4	67	29	9	75
	25-02-2024	5	32	19	6	91	36	10	116
	26-02-2024	5	32	19	6	80	45	9	111
	27-02-2024	0	30	20	4	72	37	10	117
	28-02-2024	0	29	21	0	57	33	6	118

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ଅତି ହାଲୁକା ରୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

- ସିଂଚନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗାମୀ 3-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।

- ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଦେଖା ଗଲେ ସଲଫର ପାଉଡର ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ରେ ରୋଗ ପୋକ ର ସଠିକ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- ପନିପରିବା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
- ଜମି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।

ସୋରିଷ:

- ଫୁଲ ଦେବା ସମୟରେ Urea ସାର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ ହିସାବ ରେ ପକାନ୍ତୁ।
- ଜମି ଶୁଖିଲା ଦେଖା ଗଲେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ।
- ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପେଣୀ :

- ପେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଧରିବା ସ୍ଥିତି ରେ ଅଛି।
- Urea ର ଟପ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ନିର୍ମୂଳୀ ଘାସ ଦେଖା ଗଲେ ଶୀଘ୍ର କାଢିକି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।

ବୁଟ:

- କ୍ଷେତ ରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ।
- ବୁଟ ରେ ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2.5 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dithane- M 45 @ 2.5 g/lit ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ପନିପରିବା :

ଟମାଟୋ:

- ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- ଫଳ ବିକାସ ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ଦେଖା ଗଲେ ସଲଫର ପାଉଡର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲକୋବି:

- ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb 75% WP @ 600 ml ପ୍ରତି ଏକର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- Diamond back moth ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Cartap hydrochloride @ 1 g/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଫଳ ଆର୍ତ୍ତ ଓ କିମ୍ବା ଫଳ ବିକାସ ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜଉପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 25 ଟି ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ।

ବାଇଗଣ:

- କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିକାସ ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ବାଇଗଣ ରେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଦେଖା ଗଲେ Methyl Demeton 30 EC @ 1 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ:

- ରେଡ ପମ୍ପକିନ ବୀଟୋଲ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ neem oil @ 600 ml ପ୍ରତି ଅକର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
- ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପିଆଜ:

- ପିଆଜରେ ପତ୍ର ଦାଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Mancozeb କିମ୍ବା Copper oxychloride @ 2 g/lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଲଙ୍କା:

- ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଫୁଲ:

- **ଗେଣତୁ:**
- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
- ଜଳ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ସତେଜ ରହିବ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/ltr ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ପଶୁ ପାଳନ:

- **କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ:**
- ଚିଆଁ କୁ **lasota** ଟୀକାକରଣ ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ **IBT** ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ।
- ଚିଆଁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପିବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ୱନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)