



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର

ସପ୍ତାହ -09

ତାରିଖ- 27.02.2024

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ – କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 5-8 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 31-33 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19-20 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
KENDUJHARGARH	28-02-2024	6	31	19	6	68	33	5	180
	29-02-2024	0	32	20	2	59	28	7	68
	01-03-2024	2	32	20	4	74	21	6	146
	02-03-2024	0	33	20	0	68	23	6	158
	03-03-2024	0	33	20	2	56	21	8	210

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ :

- କ୍ଷେତ ରେ ରୋଗ ପୋକ ର ସଠିକ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଏବଂ ଜଉ ପୋକ ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖା ଦେଇ ପାରେ।
- ସିଂଚନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିବେ।
- ପନିପରିବା ଅମଳ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।

ବୁଟ:

- ବୁଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ବନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି ।
- ଜମି ଶୁଖିଲା ଥିଲେ, ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କ୍ଷେତ ରୁ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବୁଟ ରେ ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2.5 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Dithane- M 45 @ 2.5 g/lit କିମ୍ବା ସଲଫର ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସୋରିଷ:

- ସୋରିଷ ରେ ପାଉଁସିଆ ରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର କିମ୍ବା କାରାଥେନ (Karathane) ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Methyl Demeton @ 0.02% ଅଥବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ (Imidachloprid) @ 2 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପେଣୀ :

- ପେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ପାଟିବା ସ୍ଥିତି ରେ ଅଛି ।
- ଯେତେ ବେଳେ ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ, ସେତେ ବେଳେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଉପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ Imidachloprid କିମ୍ବା Acephate @ 2 g/lit ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ନିର୍ମୂଳୀ ଘାସ ଦେଖା ଗଲେ ଶୀଘ୍ର କାଢିକି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା :

ବାଇଗଣ:

- ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଡୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate @ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଇଗଣ ରେ ଛୋଟ ପତ୍ର ଦେଖା ଗଲେ Methyl Demeton 30 EC @ 1 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Carbendazim @ 2 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଟମାଟୋ:

- ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମି କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗଛ ଶାଖାରେ ଅଧିକା ରୋଗ ଲାଗିଥିଲେ, ଶାଖା କୁ ଛିଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide @ 5 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଫୁଲକୋବି:

- ପତ୍ର ଦାଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb 75% WP @ 600 ml ପ୍ରତି ଏକର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- Diamond back moth ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Cartap hydrochloride @ 1 g/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଫଳ ଆର୍ମି ୱର୍ମ କିମ୍ବା ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Emamectin benzoate 5% SG @ 4-5 g/10lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବନ୍ଧାକୋବି:

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ରେ (ଅଧିକା ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ମେଘୁଆ ପାଗ) ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ Mancozeb କିମ୍ବା Carbendazim @ 2 g/lt ପାଣିରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ:

- ରେଡ ପମ୍ପକିନ ବୀଟୋଲ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ neem oil @ 600 ml ପ୍ରତି ଅକର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପାଉଁସିଆ ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଲଫର ପାଉଡର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଲଙ୍କା:

- ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL @ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଫୁଲ:

ଗେଣତୁ:

- ଘାସ ବାଛି ଗଛ ମୂଳ କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
- ଜଳ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ସତେଜ ରହିବ ।
- ମିଳି ବଗ ର ଦମନ ପାଇଁ Profenophos କିମ୍ବା Dimethoate @ 2 ml/lt ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- **ଗୋଲାପ:**
- ଦହିୟା ପୋକ (Mealy bug) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାବୁନ ଫେଣ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଦହିୟା ପୋକ ର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକା ଦେଖା ଗଲେ, ତାଳ କୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଛରୁ ଦୂରରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛି ମୂଳ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

TECHNICAL OFFICER

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, **OUAT କାଲିଙ୍ଗା** ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ନ, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)