ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡିଆ

କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 16-02-2024

ନୟାଗଡ଼(ଓଡିଶା) - :2024-02-16 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-02-17	2024-02-18	2024-02-19	2024-02-20	2024-02-21
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	35.0	34.9	35.4	36.0	36.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	19.0	18.0	18.0	19.0	20.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	61	54	77	68	51
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	21	14	16	23	22
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	6	6	8	8
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	202	120	169	193	207
ମେଘାଚ୍ଛନ (ଅକ୍ଟା)	1	0	0	2	3

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଜିଲ୍ଲା ରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ (ଶନିବାର ରୁ ବୁଧବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନର ହାରାହାରି ସାର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୪.୯-୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସି. ଏବଂ ୧୮-୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସି. ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦିନର ହାରାହାରି ସାର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୫୧-୭୭ % ଓ ୧୪-୨୩ % ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପବନର ବେଗ ୫-୮ କିମି/ଘ ରହିପାରେ। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମସୁର/ ହରଡ଼	ହରଡ ଫସଲରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮୦ ମିଲି Chlorantraniliprole ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୁଗ	ମୁଗ ଓ ବୁଟ ଫସଲରେ ଶତକଡା ୨୫ ଭାଗ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଜଳ ଦ୍ରବିଭୂତ ସାର ୧୯:୧୯:୧୯: କୁ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮ ଗ୍ରା ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ଛୁଇଁ ଧରିବା ସମୟରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ମୁଗ	ମୁଗ ଫସଲରେ ସାହେବୀ ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୬୦ ଗ୍ରା Diafenthurion 50% WP ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଝାଉଂଳା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରା Copper oxychloride 50 WP ଓ ୦.୧ ଗ୍ରା Streptocyclin ମିଶାଇ ଗଛର ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କଙ୍କେଡିଆ ପୋକ (Epilachna beetle) ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୬୦ ଗ୍ରା Emmamectin benzoate 5 SG ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଫଳ ପୋଚା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦୦ ଗ୍ରା Thiophenate methyl ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ಮೆಣಸಿನಾ್ಯಠಿ	ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ପତ୍ର ମୋଚାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୦୦ ମିଲି Propargite 57 EC ଏବଂ ୪୦୦ ମିଲି Fipronil 5% SC ଅଦଳ ବଦଳ କରି ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ପତ୍ର ମୋଚାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୦୦ ମିଲି Propargite 57 EC ଏବଂ ୪୦୦ ମିଲି Fipronil 5% SC ଅଦଳ ବଦଳ କରି ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
କାକୁଡି	କାକୁଡିରେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦୦ ମିଲି Tolfenpyrad ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ମୁଷରୁମ	ସାଇତି ରଖିଥିବା ପାଳ ଛତୁ ଚାଷର ଅବ୍ୟବହୃତ ଗୁଣ୍ଡ ନଡାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏହାକୁ ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ନଡାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହେବ।
ମୁଷରୁମ	୧-୨ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର କଟା ଯାଇଥିବା ପାଳରୁ ଲାଭଜନକ ଉପାୟରେ ଧିଙ୍ଗରୀ ଛତୁ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ।
ମୁଷରୁମ	ଛତୁ ବେଡରେ ମାଛି କିମ୍ବା ଏହାର ଶୁକ ଦେଖା ଦେଲେ, ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧-୧.୫ ମିଲି Dichlorovos କିମ୍ବା ୧.୫-୨ ମିଲି Malathion ମିଶାଇ ବେଡର ଚାରି ପାଖରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛତୁ ଗୃହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ	ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
କମନ କାର୍ପ	ପୋଖରୀରେ ମିରିକାଳି ଏବଂ କମନ କାର୍ପ ବଦଳରେ ଏକରକୁ ୫୦୦୦ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଯାଁଳ ଛାଡନ୍ତୁ।

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ	କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଚିଚକ	କୁକୁଡା ବସନ୍ତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୁକୁଡାମାନଙ୍କୁ ୬ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଟୀକା ୦.୨ ମିଲି ଡେଣା ତଳେ କିମ୍ବା ମାଂସ ପେଶୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଚିଚକ	କୁକୁଡାମାନଙ୍କୁ କୃମୀନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରତି ୨-୩ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଥରେ ଦେବା ଦରକାର।

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)	ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଅଗ୍ରିଲ ଇଂଗିନୀରିଙ୍ଗ	ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଧାଡିରେ ୩୩-୧ ୨ ୦ ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଫସଲରେ ଘାସ ବଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ ବେସୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଢ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।