



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୭୭.୦୩.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୧୩

ତାରିଖ ୨୭.୦୩.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୨୫

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୩୧.୦୩.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି– ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏହା ସହ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୮-୦୯ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୮-୪୦ ଏବଂ ୨୩-୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୬୫-୭୫% ଏବଂ ୨୦-୩୨% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ()	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଙ୍କୁ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
ଗଜପତି	୨୭-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୮	୨୩	୦	୬୫	୨୦	୮	୨୧୪
	୨୮-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୮	୨୪	୦	୬୮	୨୨	୮	୨୦୨
	୨୯-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୯	୨୪	୦	୭୪	୨୧	୮	୨୦୨
	୩୦-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୯	୨୪	୪	୭୩	୨୦	୯	୨୦୨
	୩୧-୦୩-୨୦୨୪	୦	୪୦	୨୫	୪	୭୫	୩୨	୮	୨୧୨

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି କି ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ର ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁ ଯାଉ ଚାଷ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିବେ।
- କୀଟନାଶକ କୁ ଏବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
- ବର୍ଷା ରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗଛ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଲାଗାଯାଇପାରିବ।
- ଗାଈ ଗୋରୁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ:

- Alternaria Blight ରୋଗ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ Mancozeb 0.3% କୁ ପ୍ରତି 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ୪ ଥର ସ୍ତ୍ରୋକ କରନ୍ତୁ।

ଟମାଟୋ:

- ଫସଲରେ ଫଳ ବିକ୍ଷା ପୋକ ଲାଗିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଛ ଏବଂ ପୋକ କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଅଜାଡିରକ୍ସିନ ୧.୦% EC (୧୦୦୦୦ପି ପି ଏମ) ୨.୦ମିଲି/ଲିଟର କିମ୍ବା ବାସିଲସ ୨ଗ୍ରାମ/ଲିଟର କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଚିନାବାଦାମ:

- ଚିନାବାଦାମ୍ ରେ ଚିକ୍କା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି Chlorothalonil @୪୦୦-ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ୨୦୦-ଗ୍ରାମ Mancozeb କିମ୍ବା ୩୦୦-ମି.ଲି Hexaconazole କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବାଇଗଣ:

- ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡ ବିକ୍ଷା ପୋକ
- ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପ କୁ ୧୨/ ହେକ୍ଟର ଲଗାନ୍ତୁ
- NSKE ୫% କିମ୍ବା DIMETHOATE ୩୦% EC @ ୨.୦ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

କୁକୁଡ଼ା:

- ଲିଟରକୁ ୨-୩ ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦% ଅଧିକ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ନବା ଆଣିବା, ଅଣ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଓ ଟୀକାକରଣ ରାତିରେ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗରମରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଘାତ କମିଯିବ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER