



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା  
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘୁ. ଭବନଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୦୭.୦୩.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu  
Jr. Agrometeorologist**

**ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦**

**ତାରିଖ ୦୭.୦୩.୨୦୨୪  
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୨୦**

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ  
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୨.୦୩.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

**ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ** – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୮, ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହା ସହ ଆକାଶ ସାଧାରଣ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୨ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୩-୩୫ ଏବଂ ୧୯-୨୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୫୯-୮୭% ଏବଂ ୧୭-୨୭% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି ( )	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କନ୍ଧମାଳ	୦୮-୦୩-୨୦୨୪	୧୦	୩୫	୨୦	୭	୫୯	୨୭	୨	୧୫୮
	୦୯-୦୩-୨୦୨୪	୫	୩୩	୨୦	୨	୮୩	୨୪	୨	୧୧୭
	୧୦-୦୩-୨୦୨୪	୫	୩୩	୨୧	୨	୮୭	୨୩	୨	୧୮୯
	୧୧-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୪	୧୯	୦	୮୧	୧୮	୨	୧୨୨
	୧୨-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୨	୧୯	୦	୭୭	୧୭	୨	୨୦୭

**କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ**

- ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଣିପାଗକୁ କିମ୍ବା ବର୍ଷା କୁ ଦେଖି ଦରକାର ହିସାବରେ ପାଣି ମଦାକୁ।
- ଚାଷୀମାନେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ରୁ ବିରାଟ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏହା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇଯାଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ।
- ଗରମ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ୧୦ % ଅଧିକ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସଠିକ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ।

## ଧାନ

- ଧାନରେ ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ୨୦କେଜି ଇଉରିୟା ସାର ପକାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦-ମିଲି Fipronil ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୫୦-ଗ୍ରାମ Flubendiamide ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## ଚମାଚୋ

- ଧଳାମାଛିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦-ଗ୍ରାମ **Thiamethoxam** କିମ୍ବା ୨୦୦-ମିଲି **Pyriproxyfen** ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## ଚିନାବାଦାମ:

- ଚିନାବାଦାମ୍ରେ ଚିକ୍କା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି Chlorothalonil @୪୦୦-ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ୨୦୦-ଗ୍ରାମ Mancozeb କିମ୍ବା ୩୦୦-ମି.ଲି Hexaconazole କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## ଆମ୍ବ:

- ଫଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବାଟୁଳି ଅବସ୍ଥାରେ (Marble Stage) ଏନ.ଏ.ଏ ୨୦ ପିପିଏମ୍ (Planofix ୦୪ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ:

- ସତେଜ ଲିଟର କୁ ୨ ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ବିଛାଇ ଦିନକୁ ୨ ରୁ ୩ ଥର ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ସମୟରେ ଓଲଟାନ୍ତୁ ।
- ଗରମ ଦିନରେ ୧୦ % ଅଧିକ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ବ୍ୟତିବସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଡାକ୍ ବେକ ଉପରକୁ ରଖି ପାଣିରେ ୨ରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER