କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର,କେନ୍ଦୁଝର

ସପ୍ତାହ -13 ତାରିଖ-26.03.2024

	Date	Rainfall (mm)	T-MAX (C)	T-MIN (C)	Cloud Cover	Rh Max (%)	Rh Min (%)	Wind speed (kmph)	Wind Direction (deg)
Keonjhar	27-03-2024	0	35	21	0	63	24	9	202
	28-03-2024	0	35	21	0	67	17	8	180
	29-03-2024	0	37	22	0	60	15	8	158
	30-03-2024	0	37	22	0	67	17	10	171
	31-03-2024	10	37	22	8	51	18	9	248

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ ସତର୍କ:

IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ **କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଂ କିନ୍ତୁ 31 March ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।** ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଏବଂ 31 March ରେ ମେଘୁଆ ରହିବାର ଆକଳନ କରା ଯାଇଅଛି। ପବନ ର ବେଗ 8-10 କି. ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35-37 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21-22 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସତର୍କ:

- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇ ନାହିଂ।

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ:

- ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିବା ପନିପରିବା ଅମଳ କରିନିଅନ୍ତୁ।
- ଗଛ ମୂଳରେ ଡ୍ରିପ ଇରିଗେଶନ କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସେଚନ କରିବା ଉଚିତ।
- ପୋକ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ Celphos ଟାବ୍ଲେଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

- କ୍ଷେତ ରେ ରୋଗ ପୋକ ର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିୟମିତ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

- ଜିଆ ଖତ ଅଧିକା ମାତ୍ରା ରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	**ଶସ୍ୟ ର ଅବସ୍ଥା/ ସ୍ଥିତି**	**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଦେଶ**
ବୁଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପରିପକ୍ୱ ବୁଟ କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। • ଗଛ ରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। • ବୁଟ ରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ ଲିଟର ନିମ୍ବ ତେଲ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି. ଲି Triazophos ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ପେଶୀ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ପେଶୀ କିମ୍ବା ଟିସି କୁ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ। • ମଞ୍ଜି କୁ ସଫା ସ୍ଥାନ ରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। • ଅମଳ ଟିସି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ।
ସୋରିଷ	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ସୋରିଷ ଅମଳ କଳା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରେ ଶୁଖାଇ ତାର ଆଦ୍ରତା 10-12 % ଯାଏଁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। • ସୋରିଷ କୁ ସଫା କରିକି ବଜାର ରେ ଉଚିତ ଦାମ ରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।
ପନିପରିବା:		

ଫୁଲକୋବି	ଅମଳ ଅବସ୍ଥା	• ପରିପକ୍ୱ ହେଇ ଆସିଥିବା ଫୁଲକୋବି କୁ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। • କର୍ତ୍ତକ କୀଟ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Chloropyriphos @ 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
କାକୁଡି		• ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପର ସ୍ଥିତି ରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ। • ଜିଆ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। • ଦାଉନି ମିଲଡିଉ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Mancozeb @ 2 ଗ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ତୋଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। • କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ Emamectin benzoate@ 4 g/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଲଙ୍କା	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ପତ୍ରମୋଡା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Imidachloprid 17.8% SL@ 3 ml/10 lt ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଗଛ ଝାଉଂଲା ଦେଖା ଦେଲେ ଜଳ ସେଚନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ଟମାଟ	ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ	• ବାଡି ର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗଛ କୁ ଟେକିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଟମାଟ ଫଳ ମାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସେ। • ଟମାଟ ନାଲି ପଡିଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତୁ। • ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Flubendiamide@ 5 g/10ltପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଫଳ:		
ଆମ୍ବ	ଫୁଲ/ବଉଳ	• ଆମ୍ବ ରେ ଦହିୟା ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Thiomethoxam @ 0.5 g ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। • ଆମ୍ବ ରେ ଫୁଲ ଝଡିବା କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ **Planofix @** 0.4 ml ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

କଦଳୀ		• ଗଛ ମୂଳରୁ ୩୦ ସେ. ମି ଦୂରରେ ଶଢା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । • କଦଳୀରେ ଜଉ ପୋକର ର ଦମନ ପାଇଁ **Imidachloprid @** 2 ml/lt ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ:		
ଗୋପାଳନ		• ନିୟମିତ ପିଇବା ପାଇଁ ସଫା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। • ଗୁହାଳ ଘର କୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। • ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ରେ ଘର କୁ ଧୋଇ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ।
କୁକୁଡା ପାଳନ		• ଚିଆଁ କୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧରେ Lasota ଏବଂ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧରେ IBT ର ଟୀକାକରଣ କରାନ୍ତୁ। • ପିଇବା ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଯୋଗାଯୋଗ:

ନାମ: ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ

Email: subhakantaofficial95@gmail.com

ଉତ୍ତମ କୃଷି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, OUAT କାଲିଙ୍ଗା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ (ବିହନ, ଚାରା ଏବଂ QPM, ଟିସୁ ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭିଦ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ, ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଏବଂ ସ୍ପନ୍, ବାୟୋ-ସାର, ବାୟୋ-କୀଟନାଶକ, ଜିଆ ଖତ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଫାର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ) |

IMD ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥାନର ଏଗ୍ରୋ-ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

Download: (Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot), (iOS: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155)