



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. - ସେମିଲିଗ୍ରୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗ୍ରୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେହା, କୋରାପୁର, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୯



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୧୩

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ - ୨୭.୦୩.୨୦୨୪

ଜିଲ୍ଲା- ନବରଙ୍ଗପୁର (ଇଷ୍ଟର୍ନ୍ ଘାଟ ହାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୨୭.୦୩.୨୦୨୪ ଠାରୁ ଥାରୁ ୩୧.୦୩.୨୦୨୪) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନ୍ତମାନ

(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପରିଷାର ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ରୁ ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୦ ରୁ ୨୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୪୭ ରୁ ୫୯ ଏବଂ ୧୫ ରୁ ୨୨ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ତାରିଖ	କୃଷିପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଛନ୍ତି	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୨୭.୦୩.୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୦	୦	୪୦	୧୯	୧୦	୨୭୭
୨୮.୦୩.୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୦	୦	୪୭	୧୭	୧୦	୨୪୮
୨୯.୦୩.୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୧	୦	୪୭	୧୪	୧୨	୨୪୪
୩୦.୦୩.୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୧	୪	୪୭	୧୭	୧୧	୨୪୯
୩୧.୦୩.୨୦୨୪	୨	୩୮	୨୧	୬	୪୯	୨୨	୧୦	୨୪୦

ପାଣିପାଗ ଭିତକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ସାଧାରଣ:

- ଶେଷ ଓଡ଼ି ଚାଷ ସମୟରେ ଜମିରେ ସତା ଗୋବର ଖତ ଅଥବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଯେକୋଣସି ଫସଲ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତ୍ତିକା ପରିଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଟି ପରାକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
- ମୃତ୍ତିକା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମାଟି ପରାକ୍ଷା ଭିତକ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଫସଲରେ ସନ୍ତୁଳିତସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନ:

- ବର୍ଷମାନ ପାଗରେ ଧାନ ଜମିରେ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଚେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୪୦% + ଗ୍ରାଇଫ୍ଲୁକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୨୫% ଡକ୍ୟୁଜି. କିମ୍ବା ୧ ମି.ଲି. ଏଜୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୧୭.୭% + ଗ୍ରାଇଫ୍ଲୋକାଜୋଲ୍ ୩୩.୩% ଏସ.ସି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ଏବଂ ଶୁଷ୍କଲା ପାଗ ଦେଖିବି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବଂ ବର୍ଷା ହେତୁ ଧାନ ଜମିରେ ବ୍ୟାକ୍ରେରିଆ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଓ ପତ୍ରଦାଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ଷିକୋରାଇଡ୍ ୪୦% ଡକ୍ୟୁପି. ଏବଂ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଲେମାଇସିନ୍ + ଚେଗ୍ରାସାଇକିନ୍ (୯୦+୧୦) ମିଶାଇ ପରିଷାର ପାଗ ଦେଖିବି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଚିନାବାଦାମ:

- ବର୍ଷା ପରେ ଚିନାବାଦାମ ଜମିରେ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଗୋଟିପୋକ ଏବଂ ନାଲି ସିଂହାଲୁଆ ପୋକ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରୋଫେନୋଫ୍ସର୍ ୫୦% ଲେ.ସି. କିମ୍ବା ୦.୭ ମି.ଲି. ଫ୍ଲୁବେନତିଆମାଇଡ୍ ୩୯.୩୪% ଏସ୍.ସି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପୂର୍ବାନ୍ତିମାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ହେତୁ ଚିନାବାଦାମ ଫ୍ରେଶରେ କଳଙ୍କି ରୋଗ ଏବଂ ଟୀକା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କୋରୋଥାଲୋନୀକୁ ୭୫% ଡକ୍ଟୁପି. କିମ୍ବା ୧.୫ ମି.ଲି. ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୨୪.୫% ଲେ.ସି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ଏବଂ ଶୁଖ୍ଲା ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ପୂର୍ବାନ୍ତିମାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ହେତୁ ଚିନାବାଦାମ ଫ୍ରେଶରେ କାଣ୍ଡେବତ୍ରା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ବାଦନା ଅଛି । ଦେଖାଦେଲେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟାଲାକ୍ରିଲ୍ ୮% + ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ୨୪% ଡକ୍ଟୁପି. ଅଥବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ୫୦% ଡକ୍ଟୁପି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ଏବଂ ଶୁଖ୍ଲା ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମକା:

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ମକା ଜମିରେ ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ସତା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ୩% ଏଲ୍ କିମ୍ବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ୫୦% ଡକ୍ଟୁପି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମୁଗ:

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଗ ଜମିରେ କଳଙ୍କି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କୋରୋଥାଲୋନୀକୁ ୭୫% ଡକ୍ଟୁପି. କିମ୍ବା ୧ ମି.ଲି. ଢାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫% ଲେ.ସି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ:

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଇଗଣ ଓ ଟମାଟୋ ଫ୍ରେଶରେ ଖାଉଁଲା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅଙ୍କିକୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡକ୍ଟୁପି. ଏବଂ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଲୋମାଇସିନ୍ + ଟେକ୍ରୋସାଇକିନ୍ (୯୦+୧୦) ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ପରିଷାର ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଟମାଟୋ ଜମିରେ ଉଦ୍ଭ୍ଵେଶ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଏଜାକ୍ଷିଷ୍ଟବିନ୍ ୧୮.୨% + ଢାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୪% ଏସ୍.ସି. କିମ୍ବା ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାପଟନ୍ ୫୦% ଡକ୍ଟୁପି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ଏବଂ ଶୁଖ୍ଲା ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଲଙ୍କାମରିଚ:

- ଲଙ୍କା ଜମିରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୩ ମି.ଲି. ଆଯୋମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୧୯.୭% + ଲାମତା ସାଇହେଲୋଥୁନ୍ ୯.୪% ଜେଟ୍.ସି. କିମ୍ବା ୦.୪ ମି.ଲି. ଲମିଡାକ୍ୟୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଲ୍. ମିଶାଇ ପରିଷାର ଏବଂ ଶୁଖ୍ଲା ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲ:

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାରେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲ ରେ ନିୟମମୁଖ୍ୟ ପଡ଼ୁପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଦେଖାଦେଲେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟାଲାକ୍ରିଲ୍ ୮% + ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ୨୪% ଡକ୍ଟୁପି. କିମ୍ବା ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ କିନ୍ନିରେ ୨୫% ଡକ୍ଟୁପି. ମିଶାଇ ପରିଷାର ପାଗ ଦେଖୁକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲ ଯଥା କାକୁଡ଼ି, ଲାଭ ଓ ତରତୁଜରେ ନାଲି କଖାରୁ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ବାଦନା ଅଛି, ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୫-୧୦ ମି.ଲି. ଏଜାତିରକିନ୍ ୦.୩୩% (୩୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍.) କିମ୍ବା ୦.୪ ମି.ଲି. ଏଜାତିରକିନ୍ ୫% କିମ୍ବା ୧.୮ ମି.ଲି. ସାଇଏଞ୍ଚାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୦.୭୭% ଓ.ଡ଼. ମିଶାଇ ଦୁଇଥର ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିବ୍ୟ:ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧ୍ୟକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଅଧ୍ୟକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।