



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା  
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୦୭.୦୩.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu**  
**Jr. Agrometeorologist**

**ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦**

**ତାରିଖ ୦୭.୦୩.୨୦୨୪**  
**ବୁଲେଟିନ ନଂ.୨୦**

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ**  
**ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୨.୦୩.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

**ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷମାଳ** – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହା ସହ ଆକାଶ ସାଧାରଣ ମେଘାଚ୍ଛାଦିତ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୦୭-୦୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୪-୩୭ ଏବଂ ୧୪-୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୫୯-୯୩% ଏବଂ ୧୭-୨୫% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି) (	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସି ୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମା ତ୍ରା(°ସେ ଲସିୟସ )	ମେଘାଚ୍ଛ ା (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
ରାୟଗ ଡ଼	୦୮-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୫	୨୧	୪	୫୯	୨୫	୭	୧୫୮
	୦୯-୦୩-୨୦୨୪	୪	୩୫	୨୧	୫	୭୮	୨୨	୭	୧୨୫
	୧୦-୦୩-୨୦୨୪	୭	୩୪	୨୦	୬	୯୩	୧୭	୭	୧୫୮
	୧୧-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୫	୨୦	୧	୮୦	୧୭	୭	୧୨୩
	୧୨-୦୩-୨୦୨୪	୦	୩୭	୨୦	୧	୭୧	୧୭	୭	୧୯୩

**କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ**

- ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦେଖି ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାଣିମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ବର୍ଷା କୁ ଦେଖି ଦରକାର ହିସାବରେ ପାଣି ମଦାନ୍ତର।
- ଚାଷୀମାନେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ରୁ ବିରାଟ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏହା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇଯାଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ।
- ଗରମ ଦିନରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ୧୦ % ଅଧିକ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସଠିକ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ।

## ଧାନ

- ଧାନରେ ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ୨୦କେଜି ଇଉରିୟା ସାର ପକାନ୍ତୁ ।
- ଧାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦-ମିଲି Fipronil ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୫୦-ଗ୍ରାମ Flubendiamide ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## ଚମାଚୋ

- ଧଳାମାଛିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦-ଗ୍ରାମ **Thiamethoxam** କିମ୍ବା ୨୦୦-ମିଲି **Pyriproxyfen** ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## ଚିନାବାଦାମ:

- ଚିନାବାଦାମ୍ ରେ ଟିକ୍କା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି Chlorothalonil @୪୦୦-ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ୨୦୦-ଗ୍ରାମ Mancozeb କିମ୍ବା ୩୦୦-ମି.ଲି Hexaconazole କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## ଆମ୍ବ:

- ଫଳ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ବାଟୁଳି ଅବସ୍ଥାରେ (Marble Stage) ଏନ.ଏ.ଏ ୨୦ ପିପିଏମ୍ (Planofix ୦୪ ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର) ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

## କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ :

- ସତେଜ ଲିଟର କୁ ୨ ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ବିଛାଇ ଦିନକୁ ୨ ରୁ ୩ ଥର ପାଗ ଅଣ୍ଟା ଥିବା ସମୟରେ ଓଲଟାନ୍ତୁ ।
- ଗରମ ଦିନରେ ୧୦ % ଅଧିକ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରେ ବ୍ୟତିବସ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚାଙ୍କ ବେକ ଉପରକୁ ରଖି ପାଣିରେ ୨ରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER