



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା  
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ  
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ  
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 09-04-2024

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-04-09 ( ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-04-10	2024-04-11	2024-04-12	2024-04-13	2024-04-14
ବର୍ଷା (ମିମି)	5.0	4.0	2.0	1.0	1.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	36.0	37.0	35.0	37.0	33.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	24.0	25.0	25.0	26.0	26.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	58	57	71	63	56
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	28	29	33	30	28
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	10	8	7	9	8
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	169	169	124	198	240
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	7	6	5	4	4

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହିତ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 24.0-26.0 ରୁ 33.0-37.0 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ | C. ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସର 28-33% ରୁ 56-71% ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି |

### ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି | ସ୍ଥାୟୀ ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ସାରି ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସ୍ତେ ଛଗିତ ରଖନ୍ତୁ |

### ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ଆମ୍ଭରେ ଫଳର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ + ବୋରନ୍ @ 2ml / 1l ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ |

**ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ସଏସମେ (ଗିଜାଲଃଲ୍ୟ /ତିଳ )	ବର୍ଷା ପରେ ମାଟି ର ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତା ରେ ଚାଷିମାନେ ରାଶି ବୁଣିପାରିବେ ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବୋଇତି କଖାରୁ	ଫଳ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ କଖାରୁଜାତୀୟ ପନିପରିବା ର କଅଁଳିଆ ଫଳ ଉପରେ ଅଣ୍ଟା ଦେଇ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥଦ୍ୱାରା ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି । ଅଣ୍ଟାରୁ ଛୁଆ ପୁଟି ଫଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭିତର ଅଂଶ କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି । ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ହୋଇ ବଡ଼େ ଏବଂ ଅସମୟରେ ପାଟି ଝଡ଼ିପଡ଼େ । ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ଫଳମାଛିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୪-ଲିଟର ପାଣି ରେ ୪୦୦-ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଓ ୮-ମିଲି malathion ବା DDVP କୀଟନାଶକ ମିଶାଇ ବିଷଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
ଭେଣ୍ଡା	ଭେଣ୍ଡା ଫସଲରେ ଆପିଡ, ଜାସିଡସ୍, ଥୁସ୍ ଏବଂ ଧଳା ମାଛି ଭଳି କୀଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କୀଟଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ-ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ନିମ୍ନ ତେଲ) 1500 PPM @ 600 ml / ଏକର ଏହାକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପରିଚାଳନା 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଥିଆମେଟୋକ୍ସାମ 25% WG @ 40 g / ଏକର କିମ୍ବା ଆସେଟାମିପ୍ରିଡ 20% SP @ 50 g / ଏକର କିମ୍ବା ଟୋଲଫେନପିରାଡ 15% EC @ 400ml / ଏକର ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
ବାଇଗଣ	ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲରେ ପତ୍ରପୋଡା, ଝାଉଁଳା ଓ ମୂଳଶତା ରୋଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ Metalaxyl ଓ Mancozeb ର ମିଳିତ ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ Carbendazim ଓ Mancozeb ର ମିଳିତ ମିଶ୍ରଣକୁ ୧ ଗ୍ରାମ Plantomycin ସହିତ ମିଶାଇ ଫସଲର ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

**ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ଜଳ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ୍ ।