



**ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା**

ଘ୍ନ. ଉଦୟଗିରି, ଓଡ଼ିଶା : ୧୨.୦୪.୨୦୨୪ (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

**Sri Rahul Kumar Sahu
Jr. Agrometeorologist**

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା- ୧୫

**ତାରିଖ ୧୨.୦୪.୨୦୨୪
ବୁଲେଟିନ ନଂ.୩୦**

**ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (୧୨.୦୪.୨୦୨୪) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ**

ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ – ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ତାରିଖରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଆକାଶ ସଫାରୁ ସାଧାରଣତ ମେଘାଳୁକ୍ତ ରହିପାରେ। ପବନର ବେଗ ୫-୭ କି.ମି. ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୨୮-୪୦ ଏବଂ ୧୮-୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଗତ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୪୮-୫୪% ଏବଂ ୧୮-୨୪% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷା ମିମି) (ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସି ୟସ)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମା ତ୍ରା(°ସେ ଲସିୟସ)	ମେଘାଳୁ କ୍ତ (ଅଙ୍କ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	ପବନ ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି (କିମି)	ପବନ ର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କନ୍ଧମା ଳ	୧୩-୦୪-୨୦୨୪	୭	୨୮	୧୮	୭	୪୮	୨୪	୭	୧୯୮
	୧୪-୦୪-୨୦୨୪	୦	୩୨	୧୯	୭	୫୨	୧୮	୭	୨୪୮
	୧୫-୦୪-୨୦୨୪	୦	୩୫	୨୦	୩	୫୧	୨୧	୫	୨୨୫
	୧୬-୦୪-୨୦୨୪	୦	୩୮	୨୨	୨	୫୪	୨୦	୭	୨୨୫
	୧୭-୦୪-୨୦୨୪	୦	୪୦	୨୪	୧	୫୧	୧୯	୭	୨୦୫

କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପଦେଶାବଳୀ

- କୁଆପଥର ରୁ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପରିପକ୍ୱ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ଓ ଲିଚିରେ ଛୋଟ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗଛରେ ଜାଲ ଦେଇ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |
- ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧକୁ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |
- ଫଳାଳ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲରେ ଅଧିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ |
- କୁକୁଡ଼ା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କରେ ଉଦ୍ଭାପ ଛିଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାନ୍ତୁ |

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ:

- ମଞ୍ଜି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ୨-୩ ଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ/ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ।

- ଯଦି ଫଳ ବୋରର ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ ବାୟୋଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ NPV @ 250 LE ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ |

ମକା:

- ଫଳ ଆର୍ମ୍ ଝର୍ମ
- Azadirachtin 1500 ppm @ 2.5 lit / ha କିମ୍ବା Chlorantraniliprole 18.5 SC @ 200ml / ha (କିମ୍ବା) Flubendiamide 480SC @ 250ml / ha ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ (15 - 20 DAE) |

ଧାନ:

- ଧାନ ଫସଲରେ ମହିଷା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦- ମିଲି **Hexaconazole** ନାମକ ଫିଙ୍ଗିନାଶକ କିମ୍ବା ୨୦୦-ମିଲି **Azoxystrobin** ଓ **Difenoconazole** ର ମିଳିତ ଫିଙ୍ଗିନାଶକ କୁ ୨୦୦-ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂ ଚନ କରନ୍ତୁ।

ଲଙ୍କା:

- ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଉପର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝାଡ଼ଂଳି ଥାଏ ଯାହାକି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଝାଡ଼ଂଳା ହୋଇଥାଏ |
- 1% Bordeaux ମିଶ୍ରଣ କିମ୍ବା ନୀଳ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଫାଇଟୋଲାଇଟ୍ 0.25% ସହିତ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ |

କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ:

- ଉତ୍ତାପ ସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାନ୍ତୁ।
- ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲିଟର ଚର୍ନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।

For better agriculture benefits use, OUAT KALINGA products (Seedling, Sampling & QPM, Tissue Culture Plants, Fruits and Vegetables, Value added products, Fingerlings/Yearlings, Poultry chicks, Breeds, Mushroom and Spawns, Bio-fertilizers, Bio-pesticides, Vermi & Vermi Compost).

ASSOCIATE DIRECTOR OF RESEARCH & NODAL OFFICER