



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 23-04-2024

ରାଜନଗର(ଓଡ଼ିଶା) - :2024-04-23 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2024-04-24	2024-04-25	2024-04-26	2024-04-27	2024-04-28
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	40.0	41.0	41.0	41.0	42.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	50	44	54	46	36
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	20	19	15	18	18
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	6	7	7	7	7
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	240	202	210	206	270
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅକ୍ଷ)	2	2	2	2	2

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40.0 ° c-42.0 ° c ରହିବ | ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 26.0 ° c-27.0 ° c ରହିବ | ପବନର ବେଗ 6.0-7.0 କିଲୋମିଟର ରହିବ | ପୂର୍ବାହ୍ନ (36-54%) ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ (15-20%) ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ |

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା | ବିଶେଷତା ବ୍ୟବସାୟିକ ଫସଲ ସହିତ ଫଳ ବଗିଚା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବିଭାଗିତ ପନିପରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁନ୍ଦା ଏବଂ ସିଂଚନ ଜଳ ସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ |

ମୋବାଇଲରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ପୋଟାସିୟମ ସିଡ଼ାଲହାଇଡ୍ରୋଜେନଫସଫେଟ୍ (ମୋନୋ ପୋଟାସିୟମ ଫସଫେଟ୍) ଓ ୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ବୋରାକ୍ସ ମିଶ୍ରଣକୁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
	କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨ ମିଲି ଲମ୍ବତା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରନ୍ 5% EC @ 2ml କିମ୍ବା କ୍ଲୋରିପିରିଫୋସ୍ 50% + ସାଇପର୍ମେଥ୍ରନ୍ 5% EC @ 2ml କିମ୍ବା ପ୍ରୋଥେନୋଫୋସ୍ 50% EC @ 2ml ପାଣି ରେ ସୁଫ୍ଲୋବେର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ। ଡେରି ରେ ଲଗାଯାଇଥବା ଫସଲ ୪୦-୪୫ ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଉନ୍ନତ କିସମ ପାଇଁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରାଟିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରମୁକ୍ତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବ ରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ ବୋରାକ୍ସ @ 2-3gm ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ତରବୁଜ	ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ତରବୁଜ ଫସଲ ରେ ଉଠିନିଆ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ର ପ୍ରୟୋଗ କୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ଅନାବନା ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି କୁ ଫସଲ ବାରି ପତ୍ର ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟି ରେ ନିମ୍ନ ପିଡ଼ିଆ ଦୁଇ ଥର, ଠାରେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ଧରିବା ସମୟ ରେ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ NSKE ୪% ୦.୫ ମିଲି ୧ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୧୦-୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତର ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
ନଡ଼ିଆ	ନଡ଼ିଆ ରେ ନାଲି ଘୁଣି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଗଣ୍ଡି ରେ ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭ ରେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୩% ଜ. + ବାଲି ୧:୧ ଅନୁପାତ ରେ ମିଶାଇ ଗର୍ଭ କୁ ମୁଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡା ପୋକ ଦେଖା ଦେଲେ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ପାଖ ରେ ଥିବା ଖତ ଗଦା କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଓ ୧ .୫ % କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ୍ ଗଣ୍ଡ ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ