ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ମହିଷାପାଟ,ଢେଙ୍କାନାଳ – ୭୫୯୦୧୩

Deepanjali Dugal,
Jr. Agrometeorologist

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା -୨୪

ବୁଲେଟିନ ନମ୍ବର :୪୮
ତାରିଖ : ୧୭.୦୬.୨୦୨୫
(ମଙ୍ଗଳବାର)

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା (ମଧ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧତ୍ୟକା ଜଳବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ)

ଗତ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (୧୧.୦୬.୨୦୨୫ ରୁ ୧୭.୦୬.୨୦୨୫)

ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୩୬.୦
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ)	୩୩.୦-୩୬.୬
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ)	୨୫.୩-୨୭.୦

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ୨୨.୦୬.୨୦୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗସୂଚନା

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ.)		ସର୍ବମୋଟ ମେଘାଛାନ୍ନତା (ଅକ୍ଟା)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)		ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘ.)	ପବନର ଦିଗ
		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		
18-06-2025	30	33	25	7	92	75	8	257
19-06-2025	25	32	26	8	91	77	8	262
20-06-2025	20	32	26	7	82	63	10	259
21-06-2025	9	34	27	6	83	60	6	267
22-06-2025	7	34	27	6	77	56	8	288

ଆଗାମୀ ୫ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ୫ଦିନ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରୁ ମେଘାଛନ୍ନ ରହିବ । ଆଗାମୀ ୫ଦିନ ପବନ ୦୮-୧୦ କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨-୩୪ ଡି.ସେ. ମଧ୍ୟରେ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୫-୨୭ ଡି.ସେ. ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୭୭ ରୁ ୯୨ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୫୬-୭୭ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।

ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ : ୧୮ ଓ ୧୯ ତାରିଖ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦-୪୦କିମି ଝଟକା ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା:

ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ: (୧୩ଜୁନ ରୁ ୧୯ଜୁନ ୨୦୨୫)
ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦-୩୪ ଡି.ସେ. ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ୩୪-୩୬ ଡି.ସେ. ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ: (୨୦ଜୁନ ରୁ ୨୬ଜୁନ ୨୦୨୫)
ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଓଡିଶାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦-୩୨ ଡି.ସେ. ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।

କୃଷି ସୂଚନ

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ

- ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛି, ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ମେଘୁଆ ରହୁ ଥିବାରୁ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଆଗକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଖରିଫ ବୁଣାବୁଣି, ଫସଲରେ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଫସଲ ଯଥା- ଧାନ, ମକା, ମଣ୍ଡିଆ, ହରଡ, ରାଶି ଆଦି ବୁଣାବୁଣି ପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।

❖ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା-ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ପ୍ରାମାଣିକ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।

ଫସଲ	ଅବସ୍ଥା	ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ
ଖରିଫ ଧାନ	ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା	• ଧାନ ବୁଣିବା ବା ତଳି ପକାଇବା ଆଗରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ନିହାତି ଜରୁରୀ । ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫସଲକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିହନ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । • ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଧାନ ବିହନରେ ୨ ଗ୍ରାମ କରବେଣ୍ଡଡାଜିମ (carbendazim) କିମ୍ଵା ୩ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିନ (carboxin) ଓ ଥିରାମ (Thiram) ର ମିଳିତ ଫିମ୍ପି ନାଶକ, ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
ହରଡ	ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା	• ହରଡ ବିହନକୁ ଧାଡିକୁ ଧାଡି ୬୦ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ୨୦ ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ୩-୫ ସେମି ଗଭୀରରେ ଲଗାନ୍ତୁ । • ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୫୨କିଲୋଗ୍ରାମ ଡ଼ିଏପି, ୭କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ଏବଂ ୧୪କିଲୋଗ୍ରାମ ପୋଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଚିନାବାଦାମ	ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା	• ଚିନାବାଦାମର ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଯଥା ଦେବୀ (ଆଇ.ସି.ଜି.ଭି-୯୧୧୧୪), କାଦ୍ରି-୬ (Kadri-6), କାଦ୍ରି-୯ (Kadri-9), ଟି.ଜି-୩୭ଏ (TG-37A), ଟିଏଜି-୫୧ (TAG-51), ଟିଏଜି-୩୮ (TAG-38), ଟିଏଜି-୨୪ (TAG-24), ସ୍ମୃତି, ସିଓ-୭ (CO-7), ଧରଣୀ (Dharani) ଆଦି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । • ବିହନ ବୁଣିବାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି ୨୦ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ କଲଚର ଉପଚାର କରି ବୁଣନ୍ତୁ।
ମିଠା ମକା	ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା	• ବର୍ତମାନ ମିଠା ମକା ବୁଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ମିଠା ମକାର କିଛି ଉନ୍ନତ କିସମ ଗୁଡିକ ହେଲା ମାଧୁରୀ, ପ୍ରିୟା ସୁଇଟ କର୍ନ । • ସେହିପରି କିଛି ଶଙ୍କର କିସମ ଗୁଡିକ ହେଲା Hy – brix 53 (ADVSW-2) , Hi - brix 39 (ADVSW-1) , Honey sweeter , Kobala , Nirmal -43 ଇତ୍ୟାଦି । • ମିଠା ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩-୪ କେଜି ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ରାଶି	ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା	• ଜୁନ ମଧ ଭାଗରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ ଭାଗ ଖରିଫ ରାଶି ବୁଣିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଆମ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମ ଗୁଡିକ ହେଲା ସ୍ମାରକ, ଶୁଭ୍ରା, ପ୍ରାଚୀ, ନିର୍ମଳା, କଳିଙ୍ଗ ରାଶି ୩-୧ ଇତ୍ୟାଦି । • ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩-୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । • ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନରେ ୨ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡଡାଜିମ (carbendazim) ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । • ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ସମାନ ପରିମାଣର ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ବା ବାଲି ମିଶାଇ ଧାଡିକୁ ଧାଡି ୩୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ୧ ସେମି ଗଭୀରରେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ।
ସୂର୍ଯମୁଖୀ	ବୁଣିବାପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା	• ସୂର୍ଯମୁଖୀ ଉନ୍ନତ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ଓ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨ କିଲୋ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । • ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୭ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକୁ ୨ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡଡାଜିମ (carbendazim) କିମ୍ଵା ୩ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋକ୍ସିନ (carboxin) ଓ ଥିରାମ (Thiram) ର ମିଳିତ ଫିମ୍ପି ନାଶକ, ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । • ବୁଣିବାର ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିକୁ ୪-୫ ଗ୍ରାମ Trichoderma viridaeର କବକ କଲଚର ସହ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
ଗାଈଗୋରୁ	• ବର୍ଷା ଓ ଘଡଘଡି ସମୟରେ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଗୁହାଳ ମଧରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ । ଶୁଖିଲା ଘାସ ଓ ସଫା ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । • ଗୋଖାଦ୍ୟ କିପରି ବର୍ଷା ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ନହେବା ସେଥି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ । • ବର୍ତମାନ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ।	

ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକୃତ

ଚାଷରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ଓୟୁଏଟି କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦ (ଚାରା,QPM,ଟିସୁ କଲଚର ଗଛ,ଫଳ ଓ ପନିପରିବା,ଯାଅଁଳ,କୁକୁଡା ଚିଆଁ,ଛତୁ,ଛତୁ ମଞ୍ଜି,ଜୈବିକ ସାର,ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ,ଜିଆ ଖତ,କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦି) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ MEGHDOOT ମୋବାଇଲ ଆପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

(Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot)

(iOS: https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155)