



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. -ସେମିଲିଗୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ,ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୩୦

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ - ୨୯.୦୭.୨୦୨୪

ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜୋନ)

ଗତ ତାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୨୫.୦୭.୨୦୨୪	୨୬.୦୭.୨୦୨୪	୨୭.୦୭.୨୦୨୪	୨୮.୦୭.୨୦୨୪
ଚୂଷ୍ଣପାତ (ମି.ମି.)	୩୩.୧	୨୬.୧	୧୨.୯	୧.୭
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୧	୩୨	୩୨	୩୧
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୭	୧୮	୧୭	୧୮

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୩୦.୦୭.୨୦୨୪ ଠାରୁ ୦୩.୦୮.୨୦୨୪) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ତାରିଖ	ଚୂଷ୍ଣପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୩୦.୦୭.୨୦୨୪	୧୪	୩୦	୧୮	୬	୯୨	୭୪	୧୬	୨୫୬
୩୧.୦୭.୨୦୨୪	୭	୩୨	୧୮	୫	୯୨	୭୨	୧୩	୨୫୪
୦୧.୦୮.୨୦୨୪	୫	୩୩	୧୯	୫	୯୧	୬୫	୧୦	୨୫୭
୦୨.୦୮.୨୦୨୪	୪	୩୩	୧୯	୫	୯୦	୬୨	୮	୨୬୫
୦୩.୦୮.୨୦୨୪	୪	୩୩	୧୯	୪	୮୮	୫୯	୭	୨୭୩

ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରୁ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ରୁ ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ରୁ ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୮୮ ରୁ ୯୨ ଏବଂ ୫୯ ରୁ ୭୪ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ସାଧାରଣ:

- ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବର୍ଷା ହେତୁ କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଯଦି ବର୍ଷା ସ୍ଥଳୀ ଫସଲ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ୨୮-୩୦ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।

- ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ।
- ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ - ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।
- ଡାଲି, ମକା, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
- କ୍ଷେତ ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ।
- ଚାଷୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଫାଇଆର୍ମିଖାର୍ମି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ଯଦି ୫% ଗଛ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସିନୋସାଇଡ୍ ୪୫ SC @ ୦.୫ ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ।
ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ	
ଧାନ :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ୨୭-୨୭ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଧାନ ରୋପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ➤ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେତରେ ୨-୩ ସେମି ପାଣି ଜମି ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ➤ ଘାସ ବାଛିବା: ଚାରା ଲଗାଇବାର 20 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଘାସ ବାଛିବା; ସମ୍ଭବ ହେଲେ କନୋଷ୍ଟିଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ➤ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ତେବେ ଘାସ ବାଛିବା ପରେ ଏକର ପ୍ରତି 8-10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ମକା:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କିଛି ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡକୁ କ୍ଷତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ➤ ସୁପାରିଶ: ➤ ଗଛର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆର୍ଥି-ଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ➤ ୨୭ ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଏଡାନ୍ତୁ; କ୍ଷେତ ଚିକିତ୍ସା ଶୁଖିଗଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ଫାଇଆର୍ମିଖାର୍ମି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ; ଯଦି ୫% ଗଛ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସିନୋସାଇଡ୍ ୪୫ SC @ ୦.୫ ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ।
ବାଦାମ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପେଗି ଏବଂ ପୁଡ ଗଠନ ପାଇଁ ଭଲ ପାଗ। ➤ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ୍ କିମ୍ବା ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ସ୍ତ୍ରୋ କରି ପତ୍ର ଖନନକାରୀ ଏବଂ ଚିକ୍ସା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ➤ ମୂଳ ପତ୍ତିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।
ଅବା ଓ ହଳଦୀ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ➤ ମାଟିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କିମ୍ବା ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରାଇକୋଡର୍ମା + ନିମ କେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ➤ ପତ୍ର ଦାଗ ପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ କବକନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ବିଲାତି/ଚମାଟୋ/ଲଙ୍କା :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ କବକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା। ➤ ପରାମର୍ଶ: ➤ ପତ୍ର ଦାଗ / ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ➤ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଉପରେ ଜଳସେଚନ ଏଡାନ୍ତୁ। ➤ ଫଳ-ମାଟି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଫଳ ପତ୍ତିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ପେକିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଆମ୍ବ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ। ➤ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଙ୍ଗନପଲ୍ଲୀ, ତୋଟାପୁରୀ, ବମ୍ବେ ଗ୍ରୀନ, ନୀଲମ, ହିମସାଗର, ଲାଂଗ୍ରା, ଦଶହେରି, ଆମରପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ରଢ଼ା, ରାମକେଲ୍ଲା, ରୁମାନୀ, ସିନ୍ଧୁ, ଆଲଫାନଶୋ, କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ➤ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୧ ମିଟର ଗଭୀର, ୧ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ୧ ମିଟର ଓସାର ର ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ

ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶହା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ରୁ ଗଛ ଏବଂ
ଧାଡ଼ି ରୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ୧୦ ମିଟର ରଖନ୍ତୁ।

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି
ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

ଡଃ. ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶି
(କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜି.କେ.ଏମ୍.ଏସ୍.,ସେମିଲିଗୁଡ଼ା)

ଡଃ.ପର୍ଶୁରାମ ଶିଅଳ
(ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର, ଜି.କେ.ଏମ୍.ଏସ୍.,ସେମିଲିଗୁଡ଼ା)