



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. -ସେମିଲିଗୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ,ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୩୧

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ - ୦୪.୦୮.୨୦୨୪

ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜୋନ)

ଗତ ତାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୦୧.୦୮.୨୦୨୪	୦୨.୦୮.୨୦୨୪	୦୩.୦୮.୨୦୨୪	୦୪.୦୮.୨୦୨୪
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୨.୦	୩.୧	୩.୩	୦.୦
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୩	୩୩	୩୨	୩୪
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୮	୧୯	୧୮	୧୯

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୦୬.୦୮.୨୦୨୪ ଠାରୁ ୧୦.୦୮.୨୦୨୪) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁସାଧା)

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୦୬.୦୮.୨୦୨୪	୭	୩୪	୨୦	୪	୯୩	୬୨	୨	୧୯୪
୦୭.୦୮.୨୦୨୪	୮	୩୪	୨୦	୫	୯୨	୬୫	୪	୨୧୪
୦୮.୦୮.୨୦୨୪	୬	୩୪	୧୯	୫	୯୧	୬୯	୩	୨୩୬
୦୯.୦୮.୨୦୨୪	୭	୩୪	୧୯	୪	୯୧	୭୦	୩	୨୧୦
୧୦.୦୮.୨୦୨୪	୭	୩୪	୨୦	୪	୯୪	୬୭	୩	୨୦୧

ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରୁ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ରୁ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ରୁ ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୯୧ ରୁ ୯୪ ଏବଂ ୬୨ ରୁ ୭୦ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ସାଧାରଣ:

- ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧୀ ପାତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ/ସାର ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ: କୃଷି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଚାକିରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ - ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।
- ଡାଲି, ମକା, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ପନିପରିବା କ୍ଷେତରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

- କ୍ଷେତ ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ।
- ଚାଷୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତା	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ରାଇଜୋମ୍ ପତା ପରିଚାଳନା: ଭଲ ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମେଟାଲାଇଟ୍ରିଲ୍ + ମାନକୋଜେକ୍ @ 2.5 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସହିତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ	
ଧାନ :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଜଳ ପରିଚାଳନା: କଳସ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍ପାସନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜମିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ➤ ସାର ପ୍ରୟୋଗ: କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଗ ସମୟରେ (ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ୪ କିମ୍ବା ୫ ଅଗଷ୍ଟ) ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ (ୟୁରିଆ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ କୀଟ ସତର୍କତା: ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କାଣ୍ଡ ବିକାଶକାରୀ/ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଗ୍ରୀଲକୋଗ୍ରାମା କୀର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ETL ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଗ୍ରୀଲକୋଫସ୍ 40 EC @ 2.5 ମିଲି/ଲିଟର ଖେପ କରନ୍ତୁ। ➤ ଘାସ କାଟିବା: 15-20 DAT ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଘାସ କାଟିବା; ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ମକା:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଆନ୍ତଃକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ: ଯଦି କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ 4-5 ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ମାଟି ପୋଡ଼ାନ୍ତୁ। ➤ ସାର: ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ସହିତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ (ୟୁରିଆ) ର ଟପ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ରୋଗ ନିର୍ମୂଳ: ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ନିଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମାକୋଜେକ୍ 75 WP @ 2.5 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଖେପ କରନ୍ତୁ।
ମାଣ୍ଡିଆ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଫାଙ୍କ ପୂରଣ: ବୁଣିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କ ପୂରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ । ➤ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘାସ କାଟିବା: ପ୍ରାୟ 20 ଡିଏସ୍ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘାସ କାଟିବା ଏବଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ (10 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍/ଏକର) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ଆର୍ଦ୍ରତା: ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।
ଅଦା ଓ ହଳଦୀ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ମଲ୍ଟିଂ: ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଘାସ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପତ୍ର ଲିଟର ସହିତ ମଲ୍ଟିଂକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ➤ ସାର: ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ (ଯଥା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ) ନିମ୍ନ କେକ୍ ସହିତ NPK ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜିତ ମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ରାଇଜୋମ୍ ପତା ପରିଚାଳନା: ଭଲ ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମେଟାଲାଇଟ୍ରିଲ୍ + ମାନକୋଜେକ୍ @ 2.5 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ସହିତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଆମ୍ବ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ। ➤ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଙ୍ଗନପଲ୍ଲୀ, ତୋଟାପୁରୀ, ବମ୍ବେ ଗ୍ରୀନ, ନୀଲମ, ହିମସାଗର, ଲାଂଗ୍ରା, ଦଶହେରି, ଆମରପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ରଢ଼ା, ରାମକେଲ୍ଲା, ରୁମାନୀ, ସିନ୍ଧୁ, ଆଲଫାନଶୋ, କେଶର ଇତ୍ୟାଦି। ➤ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୧ ମିଟର ଗଭୀର, ୧ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ୧ ମିଟର ଓସାର ର ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବା ପରେ ସେଥିରେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଛ ରୁ ଗଛ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ରୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ୧୦ ମିଟର ରଖନ୍ତୁ।

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

