



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. -ସେମିଲିଗୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ,ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୪୦

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ - ୦୩.୧୦.୨୦୨୪

ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜୋନ)

ଗତ ତାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୨୯.୦୯.୨୦୨୪	୩୦.୦୯.୨୦୨୪	୦୧.୧୦.୨୦୨୪	୦୨.୧୦.୨୦୨୪
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୧୮.୦	୬.୩	୯.୫	୯.୭
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	-	-	-	-
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୬	୧୭	୧୬	୧୭

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୦୪.୧୦.୨୦୨୪ ଠାରୁ ୦୮.୧୦.୨୦୨୪) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୦୪.୧୦.୨୦୨୪	୫	୩୦	୧୮	୬	୯୬	୭୭	୧୦	୨୬୧
୦୫.୧୦.୨୦୨୪	୫	୩୦	୧୯	୬	୯୬	୭୩	୬	୨୩୮
୦୬.୧୦.୨୦୨୪	୮	୩୧	୧୯	୭	୯୭	୬୨	୫	୨୩୪
୦୭.୧୦.୨୦୨୪	୭	୩୧	୨୦	୭	୯୬	୭୧	୪	୨୬୪
୦୮.୧୦.୨୦୨୪	୮	୩୧	୨୦	୬	୯୬	୬୮	୩	୨୮୩

ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ରୁ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮-୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୯୬ ରୁ ୯୭ ଏବଂ ୬୮ ରୁ ୭୭ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ସାଧାରଣ:

- ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ମେଘୁଆ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଚାଷୀମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ ।
- ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପାଣି ଜମିବା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ।
- ବିହନ, ସାର ଏବଂ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ, ଜଳପ୍ରତିରୋଧୀ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁରନ୍ତ କୀଟନାଶକ/ସାର ସିଞ୍ଚନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।

- ପ୍ରତିଦିନ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାଚା	➤ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁରନ୍ତ କୀଟନାଶକ/ସାର ସିଞ୍ଚନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ	
ଧାନ :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଅନୁକୂଳ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ଜମା ନ ହେବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ➤ କ୍ଷେତର ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ ହିଁ ଯୁରିଆର ଟପ୍ ଡ୍ରେସିଂ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ କୀଟ/ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ: <ul style="list-style-type: none"> • ମେଘୁଆ ପାଗରେ ପତ୍ର ଫୋଲ୍ଡର, କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ଆକ୍ରମଣ 10%ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ଲୋରାକ୍ସାମିଲିପ୍ରୋଲ୍ 18.5 SC @ 0.3 ମିଲି/ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ। • ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା - ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ 0.6 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ମକା:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାଟି ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା; ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ➤ ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଶରତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଯଦି ହୁଲ୍ କ୍ଷତି ୧୦% ରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ ୦.୪ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ➤ କୀଟପତଙ୍ଗ ବାସସ୍ଥାନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଘାସ ହଟାନ୍ତୁ।
ମାଣ୍ଡିଆ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ମେଘୁଆ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପାଗ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଗକୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ; ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ଯେଉଁଠାରେ ଫସଲ ଉଦ୍ଭିଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆନ୍ତଃକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ପନିପରିବା (ଟମାଟୋ, ବିଲାତି, ଓକରା, ଲଙ୍କା)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଫଳ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକାରୀ ପୋକ, ପତ୍ର କୁଣ୍ଡଳ ଭୃତାଣୁ, ବିଲମ୍ବ ପୋକ (ଟମାଟୋ/ଆଳୁ) ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ➤ ଶୋଷକ କୀଟପତଙ୍ଗ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଷ୍ଟିକ୍ ଫାଶ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ➤ ଧଳାମାଛି/ଏଫିଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିମ୍ନ ତେଲ 3% କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ 0.3 ମିଲି/ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ପଶୁପାଳନ	
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଗୃହାଳୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ➤ ରୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଫା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ➤ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ପଶୁମାନଙ୍କୁ କୃମି ନାଶକ କରନ୍ତୁ।

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

ଡଃ. ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ
(କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜି.କେ.ଏମ୍.ଏସ୍.,ସେମିଲିଗୁଡା)

ଡଃ.ପର୍ଶୁରାମ ଶିଅଳ
(ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର, ଜି.କେ.ଏମ୍.ଏସ୍.,ସେମିଲିଗୁଡା)