



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. -ସେମିଲିଗୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ,ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୪୫

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ

ତାରିଖ - ୧୧.୧୧.୨୦୨୫

ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ଜୋନ)

ଗତ ଚାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୦୭.୧୧.୨୦୨୫	୦୮.୧୧.୨୦୨୫	୦୯.୧୧.୨୦୨୫	୧୦.୧୧.୨୦୨୫
ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	୦.୦	୦.୦	୦.୦	୦.୦
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୬	୩୧	୩୧	୩୦
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୫	୧୬	୧୫	୧୫

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୧୧.୧୧.୨୦୨୫ ଠାରୁ ୧୬.୧୧.୨୦୨୫) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
୧୧.୧୧.୨୦୨୫	୦	୨୯	୧୩	୧	୭୫	୩୭	୨	୩୩୪
୧୩.୧୧.୨୦୨୫	୦	୨୯	୧୩	୧	୬୬	୨୯	୨	୧୮
୧୪.୧୧.୨୦୨୫	୦	୩୦	୧୫	୧	୬୫	୨୮	୧	୪୫
୧୫.୧୧.୨୦୨୫	୦	୩୦	୧୫	୦	୭୫	୩୦	୧	୪୫
୧୬.୧୧.୨୦୨୫	୦	୨୯	୧୩	୧	୮୦	୩୯	୧	୪୫

ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର ରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ରହିବ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୯ ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ – ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୬୫ ରୁ ୮୦ ଏବଂ ୨୮ ରୁ ୩୯ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ସାଧାରଣ:

- ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିହନ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ରବି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହି ଶୁଷ୍କ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଚାଷୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ କଳା ଚଣା, କଞ୍ଚା ଚଣା, ମସୁର କିମ୍ବା ସୋରିଷ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
- ସଂରକ୍ଷଣ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ - ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣ କୋଠରୀକୁ ଧୂଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟା ଖଜାଳିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ; ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଆଗ୍ରୋମେଟ୍ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ । ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତା	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଫସଲ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜାଳିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ	
ଧାନ :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ପାଗ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ। ➤ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବା ପାଇଁ ସକାଳେ କାକର ଶୁଖିବା ପରେ ହିଁ ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ➤ ବସ୍ତା ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଶସ୍ୟକୁ ୧୨-୧୩% ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ➤ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ତାରପୋଲିନ୍ କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ୍ ଚଟାଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ➤ କୀଟପତଙ୍ଗ କ୍ଷତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସହିତ ବାୟୁଯୁକ୍ତ ଗୋଦାମରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।
ମକା:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ କୋର୍ ଶୁଖାଇବା ଏବଂ କୋର୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଗ। ➤ କୋର୍ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ସଫା ମହଲାରେ ରଖନ୍ତୁ। ➤ ଶୁଖିଲା, ବାୟୁରୋଧୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ➤ ସଂରକ୍ଷଣ କୀଟପତଙ୍ଗ (କୋବି) ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ - ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପତ୍ର ପାଉଁଶର କିମ୍ବା ସେଲଫସ୍ ବଟିକା (ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ) ମିଶାନ୍ତୁ।
ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ(ମୁଗ,ବିରି):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଏବଂ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଭଲ ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ➤ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ ଏଡ଼ନ୍ତୁ; ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଏବଂ ପୋକ ଗଠନ ସମୟରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ➤ ପୋକ ବିକ୍ଷା ପୋକ ଏବଂ ଏଫଡ୍ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ତେଲ @ 5 ମିଲି/ଲିଟର ଶ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ➤ ଯଦି ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଗୁରୁତର ହୁଏ, ତେବେ ଏମାମେକ୍ସିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ 0.4 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ମାଣ୍ଡିଆ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ କ୍ଷେତ୍ର ଶୁଖାଇବା ଏବଂ ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଗ। ➤ କାକର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ପାନିକଲଗୁଡ଼ିକୁ ରାତିସାରା କ୍ଷେତରେ ଗଦା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ➤ ଖଳା କରିବା ପରେ, ବାୟୁରୋଧୀ ବ୍ୟାଗରେ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ➤ ରବି ଡାଲି କିମ୍ବା ସୋରିଷ ବୁଣା ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପନିପରିବା (ଟମାଟୋ, ବିଲଡି, ଓକରା, ଲଙ୍କା)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ➤ ଆର୍ଦ୍ରତା ତାପ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ➤ ଏଫାଇଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋକମାରୀ ପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ: ➤ ଏଫାଇଡ୍ ପାଇଁ: ନିମ୍ନ ତେଲ @ 5 ମିଲି/ଲିଟର। ➤ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋକମାରୀ ପାଇଁ: ମାନକୋଜେବ୍ @ 2 ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ଶ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ➤ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଘାସ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଆମ୍ବ:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ଆମ୍ବ, ଗୁଆ, ଲେମ୍ବୁ ଫସଲର ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଡାଲଗୁଡ଼ିକୁ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗଛ ପାଇଁ 10-15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଫଝାଇଏମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ➤ ଆର୍ଦ୍ରତା ତାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୁବ ବଗିଚାରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ➤ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ପତ୍ର ଦାଗ କିମ୍ବା ଡାଏବ୍ୟାକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋର୍ଡୋ ମିଶ୍ରଣ (1%) ଶ୍ରେ କରନ୍ତୁ।

ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।