



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 19-12-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-12-19 (ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-12-20	2025-12-21	2025-12-22	2025-12-23	2025-12-24
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	78	83	86	86	83
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	34	36	38	37	37
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	5	5	5	4
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	315	312	306	309	301
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କୁ)	2	3	2	1	0
ସତର୍କବାଣୀ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ, ୨୦ ରୁ ୨୪ ଡିଗ୍ରେର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ସକାଳ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବ, ୭୮ ରୁ ୮୨% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅପରାହ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ୩୪ ରୁ ୩୮% ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପବନ ୪-୫ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ବହିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ (୩୦୧-୩୧୫°) ରୁ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁତାଯିବାକୁ):

କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଗ୍ରୋମେଟ ପରାମର୍ଶ:

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ, ସାଧାରଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିନା ବାଧାରେ ଜାରି ରହିପାରିବ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଧାନ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଅନୁକୂଳ । ଚାଷୀମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅମଳ ଜାରି ରଖିପାରିବେ । ବର୍ଷା ଆଶା କରାନଯିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଝାଡ଼ି ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । କବକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଶୁଖାଇବା ପରେ (8-10% ଆର୍ଦ୍ରତା) ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ (ଟମାଟୋ, ବିଲାଡି, ଲଙ୍କା) ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବିରି	ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ରବି ଫସଲ ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ।
ସୋରିଷ	ରବି ରତ୍ନ ରେ ସୋରିଷ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ସରଳ କିସମ ଯଥା ନିର୍ମାଣ କ୍ଲବ୍ କ ଗୋଲ୍ଡ, ଲୁଚି-ଟିଏ, ଏମ-୨୭, ପି. ଟି-ଟିଗାଂଗା ଏବଂ ବିଲମ୍ବ କିସମ ପୁଷ୍ପା ପୁ ବାହାର, ବିନୟ ଆଦି କିସମ ଏକର ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୫ କେଜି ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କାପଚାନ କିମ୍ବ ଥିରା ଥି ମ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ରେ ବିଶୋଧନ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ି କୁଧାଡ଼ି ୨୦ ଏବଂ ଗଛ କୁଗଛ ୧୦ ସେମିଦୂରତା ରେ ବିଲବିମ୍ବ କିସମ ଏବଂ ଧାଡ଼ି କୁଧାଡ଼ି ୩୦ ଏବଂ ଗଛ କୁଗଛ ୧୦ ସେମି ଦୂରତା ରେ ସହଳ କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ମକା	ଚାଷିଭାଇମାନେ ଏବେ ମକା ରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କାମ ପୁଣିଶିଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଆଳୁ	ପାଣିପାଣି ଗ ସଫା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଳୁ ବୁଣିବା ଶି ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ । ରୋପଣ ପୂର୍ବପୂର୍ବରୁ 50-60 ସେମି ଦୂରରେ ସିଧାର କରାଯାଏ । ପୁରା ପୁ କିମ୍ବ କଟା ଚ୍ୟ ବର ଗୁଡିଗୁଡିକ 5-7 ସେମି ଗଭୀରତାରେ 15- 20 ସେମି ଦୂରରେ ଲଗାଯାଇ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ । ଆଳୁରଲୁ ବିହନ ହାର ରୋପଣ, ଅବଧି, ଧିବିହନ ଆକାର, ବ୍ୟବଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭରକ୍ତ କରେ । ଗୋଲାକାର କିସମ ପାଇଁ ବିହନ ହାର 1.5-1.8 t / ha ଏବଂ ଓଭାଲ୍ କିସମ ପାଇଁ 2.0-2.5 t / ha ଇଁ ଅଟେ । ଆମର ରାଜ୍ୟ ରେ ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୁଫ୍ରି ଜ୍ୟୋଡି, କୁଫ୍ରି ମୁଥୁମୁ, ଥୁକୁଫ୍ରି ସ୍ପର୍ଣ୍ଣା , କୁଫ୍ରି ଥାଙ୍ଗମ୍, ମ୍ କୁଫ୍ରି ମଲାର, କୁଫ୍ରି ସୋଗା ଏବଂ କୁଫ୍ରି ଗିରିରାଜ ସାଧାରଣତ ଚାଷ କରାଯାଏ ।
ବନ୍ଧାକୋବି	କୋବି ଫସଲରେ ଠିକିଠି କରିଆ ପୋକ ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬-୮ ଟି ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରା ଲଗାନ୍ତୁ । ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ କୁ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଏହି କୀଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲି Tolfenpyrad ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବ ୨୦ ଗ୍ରାମ Flubendiamide ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବ ୮୦ ଗ୍ରାମ Emamectin Benzoate କୁ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ପଶୁ ପାଳନ	ପଶୁ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଗାଈ	ଶୀତ ଋତୁ ରେ ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନିକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥସହ ଲୁଣ, ଚୋକଡ ଓ ଗୁଡ ଆଦି ୧୦ ରୁ ୨୦ ଶତକଡା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିତସିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)	ଅନ୍ୟ (ମୃତ୍ତିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଜେନେରାଲ ଡିବିସିଏ	ବର୍ଷା ପରେ ସଫା ଆକାଶ, ଶୁଖିଲା ଓ ପାଗ ଶୋଷକ କୀଟ ଯେପରି ଆପିଡ, ଜାସିଡସ୍, ସ୍ ଥୁସ୍ ଥୁ ଏବଂ ଧଳା ମାଛି ପରି କୀଟ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କୀଟ ଗୁଡିଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ-ମ୍ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ନିମ୍ବ ତେଲ) 1500 PPM @ 600-ml / ଏକର ଏହାକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେଣି ମିଶାଇ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଶୋଷକ କୀଟଗୁଡିଗୁଡିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଥୁଆଥୁ

ଅନ୍ୟ (ମୂଲିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)	ଅନ୍ୟ (ମୂଲିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
	ମେଥୋକ୍ସିମ୍ 25% WG @ 40- ମ୍ ଗ୍ରାମ / ଏକର କିମ୍ବ ଆସେଟାମିପ୍ରିଡ୍ 20% SP @ 50-ଗ୍ରାମ / ଏକର କିମ୍ବ ଟୋଲଫେନପିରାଡ 15% EC @ 400-ml / ଏକର 200-ଲିଟର ପାଣିରେଣି ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ଗାଈମାନେ ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଅଣ୍ଟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବିଛଣା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ଯେହ୍ନେତୁ ରାତି ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟମ ଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟାନୁସାରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଜରୁରୀ

Farmers are advised to download Unified **Mausam** and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details