



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସୁମୀ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଆ



କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 12-12-2025

ଗଞ୍ଜାମ(ଓଡ଼ିଶା) - :2025-12-12 (ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2025-12-13	2025-12-14	2025-12-15	2025-12-16	2025-12-17
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	27.0	28.0	28.0	28.0	28.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	14.0	15.0	15.0	15.0	15.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	73	77	76	75	77
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	28	32	33	32	36
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5	5	5	5	5
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	309	309	304	312	306
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ (ଅଙ୍କ)	0	0	1	0	1
ସତର୍କବାଣୀ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ	କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସାରାଂଶ:

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଆକାଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୭-୨୮° ସେଲସିୟସ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୪-୧୫° ସେଲସିୟସ୍, ସକାଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ୭୩-୭୭% ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ୨୮-୩୨% ରହିବ, ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ହାଲୁକା ପବନ ବହିବ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତା (ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 08:30 IST ଯାଁତାଯିବାକୁ):

କୌଣସି ସତର୍କତା ନାହିଁ

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର କୃଷି ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଓ ସଂସ୍କୃଷ୍ଟ ଏଗ୍ରୋମେଟ ପରାମର୍ଶ:

ଅଣ୍ଡା ରାତି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ଡାଲି ଫସଲରେ ପାଉଁଶର ମିଳୁଥିବା ଏବଂ ପନିପରିବାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝାଉଁଳା/ଡାମ୍ପିଂ-ଅର୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇପାରେ; ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ସଲଫର୍ କିମ୍ବା କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ @ 2.5 g/litre ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

ଧାନ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଅନୁକୂଳ। ଚାଷୀମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅମଳ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ବର୍ଷା ଆଶା କରାନଯିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଝାଡ଼ି ଏବଂ ଶୁଖାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କବକ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଶୁଖାଇବା ପରେ (8-10% ଆର୍ଦ୍ରତା) ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ (ଚମାଟୋ, ବିଲାତି, ଲଙ୍କା) ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଦାମ	ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ରବି ଫସଲ ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।
ସୋରି	ସୋରିଷରେ ଶୋଷକ କୀଟ ପାଇଁ (ଅଣ୍ଡା ପାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରେ)। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ତେଲ @ 2 ମିଲି/ଲିଟର ସ୍ତ୍ରୋଷ କରନ୍ତୁ।

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ପ୍ରବଳ	ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ବନ୍ଧାକୋବି	ଡେରିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କୋବି ରେ ଏବେ NSKE ୫% ହିସାବରେ କିମ୍ବା Cartap Hydrochloride ୧ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହାରା diamond back moth ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇହୁଏ।

ଆବହାବିକ ସତର୍କତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ (ସାଧାରଣ):

ଗାଈମାନେ ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବିଛଣା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।

ପ୍ରଭାବ ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ (ସାଧାରଣ):

ଯେହେତୁ ରାତି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ଚାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟମ ଥାଏ, ତେଣୁ ସମୟାନୁସାରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ଜରୁରୀ।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightning.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>